

卷  
三二

吉慶堂









新出白卷之一

吳興 金瓶生面風火輪

酒釀 紅 散碎獅子雙峰 一都

○ 可

○ 之病宜治心火

○ 心火

○ 女子不月其得

○ 血不流

○ 則不

○ 不

○ 不

○ 不

BGA2936  
V.2



齊東野語 目錄之二

吳興

金德生聞風父輯著

金斗

張孫振公武父訂正



齊陰綱目卷之二

吳興 金德生聞風父輯著 金斗 張孫振公武父訂正

西陵 江 淇澹漪子箋釋 一都 查 望于周父叅閱

經閉

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病

發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王啓玄註曰大腸

胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化

味不化則經不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣

愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心絡於胞中今

氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服局

傷心火養脾血是從本文之義愚謂當原隱曲推解蓋人有隱情曲意難以舒其衷者則氣鬱而不暢則心氣不開脾氣不化水穀日少不能變見氣血以入三陽之血海矣血海無餘所以不月也傳為風消者陽明主肌肉



消瘦平風之

名火之化也

故當秘不得

隱曲上看乃

有本

宜方固有在

然不必太泥

因人易轍可

也

據此論當有

四證如胃執

包絡執勞心

執三蓋皆有

餘宜瀉火養

血是矣而所

言脾胃久虛

改經水斷絕

症又當以

一

○論經閉不行有三治宜補血瀉火

經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈

津液所化津液既絕爲熱所燄肌肉漸瘦時見渴燥血海枯竭病

名曰血枯。經絕宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此病或經適

行而有子亦不成而爲胎病者有矣此中焦胃熱結也或心包絡脉洪

數躁作時見大便秘澁小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血

海乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣此下焦胞或因勞

心火上行月事不來者胞脉閉也胞脉者屬於心而絡於胞中

氣上逆痛。氣不得下通。夜月事不來。宜安心。痛血。寫火。經自

古今圖書集成  
禮典典考  
卷一百一十五



致經水斷絕  
今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自

補脾胃為主  
豈得捨而勿  
行矣此上焦心  
肺熱結也

論耶蓋水入  
於經其血乃  
生穀入於胃  
脉道乃行水  
去榮散穀消  
衛亡况脾統  
諸經之血而  
以火虛之脾  
胃以致氣血  
俱衰者可不  
為之補益乎  
即此以分虛  
實明是四證  
無疑而更全  
善乃遺補虛  
一證何歟  
此病机也宜  
知

婁氏曰右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四  
物之類瀉火者東垣分上中下故火在中則善食消渴治以調胃  
承氣之類火在下則大小便秘瀉治以玉燭之類玉燭者四物與  
調胃承氣等分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類三  
和者四物涼膈等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和  
玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

○論經閉因肝勞血傷

駱氏曰經云有病胸脇肢滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液  
先唾血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此年少時因大脫  
血或醉而入房虧損腎肝蓋肝藏血受天一之氣以為滋榮其經



胸脇滿證人皆伐肝豈知血枯之故宜養肝血也當願識此

既分肝脾當分兩治

發所未發

上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸脇滿妨於食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝病而肺乘之則唾血四肢清目眩時前後血出皆肝血傷之症也

○論經閉因勞當大補脾胃

良方云婦人月水不通或因醉飽入房或因勞役過度或因吐血失血傷損肝脾但滋其化源其經自通若小便不利若頭眩腰痛皆作痛是寒時痛久而血結於內變為癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通變為水腫若脾氣衰弱不能制水漸漬肌肉變為腫滿當益其津液大補脾胃方可保生王節齋曰婦人女子經脈不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉丸血輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少



是但有肝氣鬱滯以致脾土失運不能化血者又須和肝氣為要醫者知之

食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等分脾肝藥能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

○論室女經閉成勞因思慮傷心

奭奭

冠宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病末有不先傷其血氣者若室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色消散女子則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水先閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則木氣不榮而四肢乾癢故多怒鬢髮焦筋骨痠若五臟傳遍則死



此用青蒿者  
亦不妨以其  
清氣中熱也  
暗室一炬

亦須兼脾益  
胃陽脾陰主  
治有異也

自能改易心志用藥扶持庶可保生切不可用青蒿里蟲等涼血  
行血宜用栝子仁丸澤蘭湯益陰血制虛火  
薛氏曰經云五穀入於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積  
於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸榮氣者泌其津液注之於  
脉化以爲血以榮四肢內養五臟六腑若服苦寒之劑復傷胃氣  
必致不起

一室女年十七病久不愈天癸未通發熱咳嗽飲食少思欲用通  
經丸余曰此蓋因稟氣不足陰血未克故耳但養氣血益津液其  
經自行彼或於速効仍用之余曰非其治也此乃剽悍之劑大助  
陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛後果經血妄行飲食愈  
少遂致不救

脈經云有一婦人年一女子年十五時來言女子年十四時經水  
自下今經反斷其母言恐其血虛若夫夫人親女必夫人年十四



既有避年之名不必強求其治

分耗也

脉經云有一婦將一女子年十五時來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言悲怖師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿怪後當自下此真氣猶怯稟賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五臟自和而經脉通矣

論經閉因積冷結氣

要略曰婦人之病因虛積冷結氣為證經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結纏臍寒疝或兩脇疼痛與臟相通或結熱中病在關元脉數無痞肌若魚鱗時着男子非止女身在下水寒經脈不勻今陰挈痛小腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣滿遺精腰膝疼痛奄忽眩



據此吐法能  
孝子知名則  
可在他人則  
不可用吐固  
是方法然而  
休虛者不宜

胃狀是煩顛或有憂慘悲傷多嘔此皆帶下非有鬼神入則煩瘦  
脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實繫弦行其鍼藥治  
危得安其雖同病脈各異源子當辯記勿謂不然

○論經閉因痰飲所隔

張子和云凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散或歸湯  
三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水  
道之藥也

一婦人月事不行寒熱往來口乾煩赤飲食少且暮間欬一二聲  
諸醫皆用重湯水蛙乾漆硃砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟戴  
人不然曰古方雖有此法奈病人服之必膈腹發痛飲食不進乃  
命止藥飲食少進內經曰二陽之病發心膈心受之則血不流故



用亦須形病  
俱實

形盛氣實病  
真藥當然其  
輕試之法慎  
之

女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出  
痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然滑流月事不  
為水濕所隔日依期而至矣亦不同虫蠱水腫之類有毒之藥如  
用之則月經總來小洩反閉他證生矣凡精血不足宜補之以食  
大忌有毒之藥偏勝而致天關多矣

一婦人年二十四歲經水不行寒熱往來面色萎黃唇焦煩赤時  
咳三三聲問其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚風散  
建中湯寧肺散鐵艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先  
涌痰五六升午前涌畢午後進食餘證悉除後二日復輕涌之又  
去痰一二升食益進不數日又下通經散湯訖一二升數日去痰  
皮數重小者如雞片大者如羣膜不月餘經水自行神氣大康矣



論下利經斷利止經來

脉經曰婦人下利而經水反斷者何也師曰但當止利經當自下勿怪所以利不止而經斷者但下利亡津液故經斷利止津液復經當自下若婦人血下咽乾而不渴其經必隨此榮不足本自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

論經閉總因血滯血枯

李氏曰婦人以血為主天真氣降壬癸水合腎氣全盛血脉流行當以三旬一見以象月盈則滿故日月經經行與產後一類若其時餘血一點未淨或外被風寒及濕冷暑熱邪氣或內傷生冷七情鬱結為瘀為癥凝積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服燥熱以致火動邪氣盛而津液耗曰血枯



經氣逆上  
錯經妄行  
怒則氣逆上  
冲其則嘔血

### 總結

良方云經後被驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則血水相搏變為水腫。怒則氣血逆於腰腿心腹背腸手足之間重症經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血癩瘵血風癢瘍等病加之經血滲漏於其間遂成瘀血生瘡淋瀝不斷熱相搏遂為崩帶血結於內變為癥瘕凡此變證百出不過血滯與枯而已。但血滯亦有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已。○血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也。若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也。但不可純用峻藥以虧陰道至於耗氣留血之說雖女相要法



以用感血肺  
去氣也

但血爲氣。氣熱則熱。氣寒則寒。氣開則升。氣閉則降。氣行則行。氣滯則滯。如果鬱。火氣盛於血者。方可單用香附。左散。抑氣散。當加木香。檳榔。枳殼。以開鬱行氣。若氣亂則調。氣冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二臟。則宜肝旺於肺。其實氣血平和。有孕故經曰。兩臟通和。但婦人見偏性。如妄志不得伸。鬱怒無時不起。故香附爲女人仙藥。經曰。邪氣勝則實。正氣尊則虛。可不悟諸大槩。只虛熱痰氣四證而已。不調亦大相。隨證調治。飲食調和。自然血氣流通。更有凝滯。然後可用紅花當歸散。紫葳散。通經丸。導經丸之類。虛者只用當歸散以通之。通後又須養血益陰。使津液流通。苟不務氣血克和。而惟以毒藥攻通。是求



千金於乞正必死而後已

論經閉大法

丹溪云經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因

久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失

血治宜生血補血除熱調和之劑隨證用之或因七情傷心心氣

停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

脉法

脉經曰腎脈微濇為不月經閉脉法傳前調經閉當參看

治血枯經閉

玉燭散治胃熱消渴減食漸瘦津液為熱燥竭以致血海乾枯

此即四物湯與調胃承氣湯合方也

生血在補脾  
胃調飲食適  
寒溫所調脾  
旺則能生血  
也至於心氣  
結者宜調心  
又為心主血  
也

惟心病氣實  
胃熱者方可



此治勞心之  
實熱者也如  
心虛而熱收  
於內與天心  
虛而上衰者  
不宜妄用

當歸

川芎

白芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右剉每服八錢水煎食前服

三和湯

治勞心心火上行以致胞脉閉塞月事不來此即四物湯與涼膈

散合方也

當歸

川芎

白芍藥

地黃

大黃

朴硝

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

各等分

右剉每服八錢水煎服

二黃散

治婦人室女經脉不通服之如神

大黃

燒存性二錢

生地黃

三錢

右爲末作一服空心好酒調下

二氣丸

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴不思食有燥熱



以醋熬大黃  
作膏引之人  
肝以行血也  
四方俱用大  
黃而配合不  
難明物自有  
輕重緩急不  
同宜加詳之  
心胞是多血  
之經此胞原  
當指心胞而  
言  
熟地以補天  
一之水入參  
以生天一之  
元所謂水生  
於氣也然氣  
不降則水不

以柴胡引子相泰服之

大黃

四兩另為末醋一升慢火熬為膏子

當歸

白芍藥

各二兩

右為末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前服

日進三服

五補丸

補諸虛安五臟堅骨髓養精神凡胞脉閉先服降心火

之劑後服此丸及衛生湯以治肝養血也

熟地黃

人參

牛膝

酒浸去蘆焙乾

白茯苓

地骨皮

各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸空心溫酒下

衛生湯

當歸

白芍藥

各二兩

黃芪

三兩

甘草

一兩

右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服○如虛者加入



生故用白茯苓

以降天氣

地骨皮以清

氣中之火牛

膝引之下行

此方之大

意也

五補丸補水

之源衛生湯

行已生之血

益地黃茯苓

人參俱補氣

氣之不足而

黃真甘草又

益表氣之不

足當歸芍藥

行肝血之不

足言先後天

之意也

血於心

參一兩

潔古先服降心火之劑者蓋亦冬連三和玉燭之類後服五補

衛生者亦補氣之劑也

柏子仁丸

治血虛有火月經耗損漸至不達日漸羸瘦而生潮

熱並治室女思慮成勞經閉慎勿以毒藥通之宜此兼服澤蘭

湯

柏子仁

炒另研

牛膝

酒洗

卷柏

各半

澤蘭葉

續斷

各二兩

熟地黃

三兩

酒浸半日

石研

內搗成膏

石為細末

煉密丸如桐子大空心米飲下三十丸

澤蘭湯

治證同前

妙在澤蘭為君

澤蘭葉

三兩

當歸

酒洗

芍藥

炒各

甘草

五錢

加味補中益氣湯 治飲食勞傷損傷脾胃氣弱體倦發熱作渴



人之壯則精而血在故用補子以潤而生火芝下氣平之故用熟地黃以滋水其種通血脈而經者也若胃寒而色不華者去生地花粉有虛火者宜如

此方溫補氣血為主所謂勞者溫之損者溫之是也

右為粗末每服五盞水二盞煎一盞溫服  
加味補中益氣湯 治飲食勞倦損傷脾胃氣弱體倦發熱作渴  
飲食減少而不生血者

黃芪 人參 甘草炙白朮 當歸 陳皮各一錢 升麻  
柴胡各一錢 生地黃 天花粉各八分

右剉作一服水煎服

十全大補湯 治墮胎及多產育傷血或誤服汗下剋伐之藥以致血衰氣乏而經不行者

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 當歸 川芎 白芍藥  
熟地黃 黃芪 肉桂各二錢

右作一服水煎服



已上十一方  
重在血枯一

字

凡通經消塊

俱用破氣劑

聖大熱大毒

之類而此方

俱以行氣調

氣血用散劑

氣燄下元之

藥等分而又

以山梗源藥

佐之何也復

聞山梗能治

塊中之火未

間能治三年

之塊而通經

也在善用之

此溫行之劑

養真湯 治婦人經閉不通臍下有塊已經三載百藥無效服此

數劑經行又投數劑而塊消矣

當歸酒洗

川芎

白芍藥酒炒

熟地黃酒炒

白茯苓

陳皮

梔子炒

山茱萸去核

益母草

小茴香酒炒

香附子各等分

右劉每服一兩水煎服

五六劑後經通作丸

○治血澁經閉

溫經湯

治經道不行繞臍寒疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於

血室血凝不行為氣所神新血與故血相搏所以作痛宜此湯

與桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬朮各一錢

人參

牛膝各一錢

甘草炙五分



也以其用之

當歸 川芎

桂枝 桃仁 湯

牡丹皮

赤芍藥

玄胡索

地黃 忍冬 湯

耳八參 得官

桂則能溫行

故加之然諸

痛忌參朮亦

有不必用者

在人取之有

法焉

此皆破血之

藥然不用川

芎以行血海

之血而用白

芷以行陽明

之經者以血

海隸乎陽明

右吹咀水二鍾煎至一鍾不拘時服

桂枝桃仁湯 治證同前

方見調經門 疼痛條

紅花當歸散 治婦人經候不行或積瘀血腰腹疼痛及室女月

經不通

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 蘇木 甘草 各二兩

赤芍藥 兩 劉寄奴 五兩 桂心 白芷 各一兩半

右為細末空心熱酒調下三錢食前臨臥再服○若久血不行

濃煎紅花酒下孕婦勿服 一名凌霄花即紫葳

行經紅花湯 治婦人室女經候不行時作脹痛

當歸尾 赤芍藥 紫葳 劉寄奴 牛膝 玄胡索

丹參 同用

治血前經閉方



桃仁乃厥陰  
肝經藥要分  
別些義

紅花

蘇木

桃仁

炒各一錢

青皮

香附各八分

桂心

五分

右作一服水煎空心服

總是破血行  
經藥而發熱

凌花散

治婦人月水不行發熱腹痛

當歸

赤芍藥

凌霄花

劉寄奴

牡丹皮

酒洗玄胡索

官桂

白芷

紅花

酒浸各等分

右吹咀每服四錢水一盞酒半盞煎服

瑞金散

治婦人血氣撮痛月經不行

片薑黃

四兩當歸

赤芍藥

川芎

牡丹皮

蓬莪木

延胡索

官桂

紅花

各二兩

右吹咀每服八錢水一盞酒三分煎八分食前服

土牛膝散

治婦人室女血閉不通五心煩熱

平  
善黃義木文  
即有氣在肝  
之理

人血理作經

土牛膝

當歸

赤芍藥

川芎

牡丹皮

蓬莪木



即衣在肝  
之理  
右咳吐衄服八錢水一盞酒三升分服八分食前服

重五血閉黃  
信此以治婦  
人血塊作痛

有効

專主在脉絡

此專在氣

沈眠滿根血  
瘀來

土牛膝 當歸尾 各一兩  
桃仁 去皮 通炒 紅花 各半兩

右為細末每服二錢空心溫酒下

當歸散 治血脉不通

當歸 穿山用 微炒 蒲黃 炒各半兩 辰砂 一錢 麝香 少

右為細末研勻每服二錢食前熱酒調下

琥珀散 治心膈迷悶腹臍撮痛氣急氣悶月信不通等疾

天台烏藥 二兩 當歸 蓬朮 煨切各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下後以食壓之忌生冷油膩

後諸疾炒薑酒調下

桃奴飲子 治婦人室女月經不通漸成脹滿及治男子墜馬跌

撲損傷以致瘀血停積欲成血蠱病者悉皆治之



銀濁陰之物  
以破海積之  
血佐溫熱之  
味以行停滯  
血氣蓋為氣  
血流也

妙在以生地  
汁熬破血藥  
大有見解

不用重承  
蛙斑貓之類  
是重劑中之  
輕者最穩

桃奴

桃樹上嫩桃乾而不假鼠糞即淮鼠糞也  
落者冬月及正月收

五靈脂

肉桂 香附子 砂仁 桃仁去皮尖另研各等分

右為細末

每服三錢空心溫酒調下

萬病丸

治經事不來繞臍寒疝痛

乾漆

杵研炒烟盡須青白如此一時牛膝去苗酒浸一宿焙乾各一兩

右為末

以生地黄汁一升入二藥末銀器內慢火熬可丸即丸

如桐子大每服二九空心米飲或酒下

已上

諸方俱輕劑隨寒熱選用

通經丸

治經閉不通及血塊疼痛

歸尾

桃仁去皮尖 大黃煨 牡川皮 乾漆炒烟盡 肉桂

牛膝

莢木各一兩 三棱醋炒 麝香八分

九米湯下



是重補中之  
歸尾 桃仁 去皮大黃 牡丹皮 乾漆 肉桂

右為末。皂角五錢。芫花二錢。水煎糊為丸。如桐子大。每服五十丸。米湯下。

產寶方。治月經不通腹中痛。

牛膝

六分

大黃

桃仁

去皮

細辛

各五分

川芎

當歸

各四分

水蛭

三分

米炒黃

右為細末。煉蜜丸。桐子大。每服二十丸。空心溫酒下。

千金桃仁煎。治血積癥瘕。月水不行。

大黃

溫紙裏煨

桃仁

去皮

朴硝

各二兩

蜚蠊

一兩

去足

右為細末。醋二升半。銀石器中慢火熬膏。却入大黃。蜚蠊。桃仁。

末不住攪。度可丸。却入朴硝再攪。良久出之。是如桐子大。五更。

初溫酒下五丸。至日午取下。如赤豆汁。雞肝。蒜。薑。衣。棧。候鮮紅。

此涼行之劑。血因熱結者宜之。

水蛭須炒十分熟。益生則害人也。



按方廣云月  
候不通有血  
滯者血枯者  
此方用之於  
血帶則可用  
之於血上枯  
是求千金於  
之而矣審之  
聖藥皆血  
故用之以破  
血苟非血塊  
不宜用

血氣者  
也該用大補

佳仍以調氣藥補之

血和通經丸 治婦人經水凝滯不行腰骨痛腹疼痛漸成血塊

芍藥 當歸 木香 肉桂 乾漆 五靈脂 大黃

廣茂 半兩 水 炒二錢半 龜 三十個去 桃仁 二十七個湯

右為末醋糊丸如桐子大食前醋湯或酒下二十丸

班貓通經丸 治經候閉塞亦治乾血氣

班貓 二十個 糯米炒 桃仁 四十個 炒 大黃 五錢 絹漉者

右為末酒糊為丸如桐子大空心酒下五丸甚者十丸○如

血枯經閉者用四物湯送下○一方加黃蠶半錢木蛭一錢

大黃膏 一名將 治婦人乾血氣

川大黃四兩為末用醋熬成膏子丸如鷄頭大每服一丸



血氣者  
其加當歸  
榮血一週  
也任人自擇  
之

血行脈最  
穩固

此方類聚大  
熱之藥非因  
寒凝氣滯血  
結成瘕者不  
可服

酒化開臨臥溫服大便利一二行紅脈自下是調經之仙藥也。○一方加當歸頭。○一方加香附二兩童便浸炒為末入膏丸桐子大熱酒下四十九。

聖惠方。治婦人月水澀滯不快結成瘕塊脹大欲死。

馬條草根苗五觔剉細水五斗煎至一斗去渣別以淨器盛熬成膏食前溫酒調下半匙。

通經丸。治婦人室女月候不通或成血瘕。

當歸 桂心 青皮 乾薑 炒 川椒 炒出 川烏 炮 蓬莪朮

乾漆 炒 烟 大黃 炮 桃仁 去皮尖炒 各等分

右為末先將四分用米醋熬成膏和餘六分或酒白中忤丸如桐子大晒乾每服一十九用淡醋湯下加至三十丸溫酒亦得。



空心食前服。○濟生方去川烏加紅花

本草入陽子清同丸  
畏寒入陽胃生瘡也

○已上諸方俱重劑隨寒熱酌用

○治痰結經閉

丹溪方。治積痰傷經不行夜則妄語

此方平中有  
可註疾之法  
從委語來

瓜薤子

黃連半兩

吳茱萸

十粒桃仁五十枚

紅麴

二錢縮砂三兩

山查末

一兩

右為末生薑汁研炊餅為丸每服百丸空心滾白水下

方。治月水不通屢試有驗

形實氣盛  
皆宜之

厚朴不拘多少薑汁炙香細切濃煎去渣空心服不過三四

劑瘕

加味導痰湯。治軀脂經閉

此治胃實痰  
盛之藥非為  
降心火也其  
通經止取四

據言屢驗大  
抵因胃氣實  
也

右加生薑水煎服



之思之  
之最富者思

氣上迫肺是

言心火上炎

迫金金不降

而生水宜降

心火為平或

壯水之主以

制陽光亦是

巴豆大毒能

無傷乎

思之思之

半夏 陳皮 白茯苓 甘草 枳實 黃連 川芎

右加生薑水煎服。

經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用蓮朴之類

導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也。

掌中金丸 治婦人乾血。

穿山甲 炮 甘草 苦丁香 川椒 苦薺 壁

白附子 猪牙皂角 草烏頭 各一錢 巴豆 二錢全

右為細末以生葱絞汁和丸彈子大每用一丸新綿包之納陰

中一日即白二日即赤三日即血神效。

礞石丸 治婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物

礞石 三錢 杏仁 分

齊全補月 卷二 治血虛經閉 一



右二味末之煉蜜丸。藥核大內陰中。刺者再納之。

一粒仙丹。治婦人乾血勞。血赤白帶下。種子如神。

巴豆一百二十個去殼用新磚一個將豆紙包放磚上槌去油令淨如麵自方好川斑去翅足

穿山甲五錢油煎過 大黃黃蘗各一兩

皂角一兩胡去粗皮火炮

法固巧然必  
果有乾血存  
子宮者可用

右各為末合一處以棗煮去皮核丸如彈子大用綿繭張開裹藥在內穿入三寸竹筒上頭後仍留三寸餘挽一轉不令藥氣在外用時先以溫水洗陰內令潮濕拭乾却以葱汁浸濕藥頭送入子宮極深處整一日一夜取出藥不用少閉耳冷氣下發寒發熱如傷寒狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下忌生冷發物自此子宮和煖而交媾



則有孕矣。

通經下取方 曾試驗神効

海蛤粉

錢五

苦苧麋

牙皂

各二錢半

巴豆

畧去油

天花粉

五錢

苦丁香

紅娘子

各一錢半

麝香

少許

右爲細末，每用一錢，葱汁同搗爲丸，薄綿裹以五寸竹管納陰戶中，候熱時先通黃水，次則經行。

血崩

論崩中由傷損衝任

據言氣虛不能約制，則宜補氣，其爲熱所乘者，則宜涼血，不當凝。

良方論曰：婦人崩中，由臟腑傷損衝任，血氣俱虛故也。衝任爲經脉之海，血氣之行，外循經絡，內榮臟腑，若無傷損，則陰陽和平，而氣血調適。若勞動過多，致臟腑俱虛，而衝任之氣亦虛，不能約制。

言調脾胃為  
主。觀東垣法  
便得其然。

其經血故忽然暴下。或曰陰陽相搏為熱所攻。傷衛任血得熱則流散。甚者至於昏悶。其脈數疾。小為嘔。洪大為逆。大法當調補脾胃為主。

○論血崩因虛熱

東垣曰。陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損。致命門脈沉細而數。疾或沉弦而帶大有力。寸關脈亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相

火相合。熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白

帶者。脈必弦。氣必寒。作於中有赤帶者。其脈洪。熱明矣。必腰痛。

或臍下痛。臨經欲行。而先發寒熱往來。兩脇心縮。兼脾胃證出。見

或四肢困熱。心煩悶。不得眠。臥心下急。宜大補脾胃而升降氣血。

可一服而愈。或先貴而後賤。或先富而後貧。病名脫營者。心氣不

心下急。或先貴而後賤。或先富而後貧。病名脫營者。心氣不



此雖出脾  
胃症而煩心  
心下急交有  
虛火矣  
心主以營故  
曰心病

陽氣肉動便  
是胞絡中有  
火

何以知肝經  
有風

薛氏所論凡七  
條而脾胃三條

足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質  
肌肉顏似不病者此心病也不形於脉故脾胃飲食不調其證顯  
矣而經水不時而下或適來適隨暴下不止治當先說惡死之言  
勸諭令懼死而心不動以大補氣血之藥補養脾胃微加鎮墜心  
火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕  
胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛  
發則肌痺傳為脉痿此之謂也

薛氏曰經云陰虛陽勝謂之崩又云陽絡傷血外溢陰絡傷血內  
溢又云脾統血肝藏血其為患因脾胃虛損不能攝血歸源或因  
肝經有熱血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒  
動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱熱血傷而不歸經或因悲哀太

肝經三條胞絡一係合柴

胡及極芳丹皮者以厥陰手足

一經為多與厥血之所血為熱

迫則不能從腸運起故以引運

肝氣而極芳丹皮收陰抑陽也如

東垣升陽與經之意看得其義

所升脾胃方氣必是久病之

出脾胃言之益立於先生

治久病者多其言如此自

謂四君為由

長功須知補作之法

處在此

過胞絡傷而下崩治療之法脾胃虛弱者六君子湯加當歸川芎

柴胡脾胃虛陷者補中益氣湯加酒炒芍藥山梔肝經血熱者四

物湯加柴胡山梔蒼朮肝經風熱者加味逍遙散或小柴胡湯加

山梔芍藥牡丹皮若怒動肝火亦用前藥脾經火者歸脾湯加

山梔柴胡牡丹皮哀傷胞絡者四君子湯加柴胡升麻山梔故東

垣丹溪諸先生云凡下血證須用四君子以收功斯言厥有旨哉

若大去血後母以脉診當急用獨參湯救之其發熱潮熱咳嗽脉

數乃是元氣虛弱假熱之脉也尤當用人參之類此等證候無不

由脾胃先損而患故脉洪大察其中有胃氣受補則可救設用寒

涼之藥後傷脾胃生氣反不能攝血歸源是速其危也

方氏曰血屬陰也靜則循經榮內動則錯經妄行蓋人之七情過

思謂止止之正謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩中初用止血以



思謂止澁之  
中須寓清涼  
而清涼之中  
又須破瘀解  
結至於補血  
還舊又須調  
脾其間兼論  
或有不同又  
當得其所以  
而治焉似難  
盡一也  
開口便得經  
旨自是不凡  
此大寒之劑  
非實熱症可  
非前藥之悞  
不可

極則動五志之火五志之火亢甚則經血暴下失期而來久而不  
正謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以  
塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其  
流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則  
孤子之嗚無以立故本末勿遺前後不紊方可言治也

張子和云孟官人母五十餘血崩一載余用澤蘭丸歸神散保安  
九白薇散補之不效戴人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得  
熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系  
爲之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉  
有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服  
大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙

即陰虛陽揮  
之治

所見証俱原  
肝脾宜審之  
以脾症而用  
扶脾遠志何  
也豈所謂補  
脾不愈而當  
補心歟然  
則陳皮亦不  
可少  
此佐金丸法

當歸二兩焙三味同為細末水調下又服續命丸不旬日而安

西園公治一婦人年六十二歲血崩不止投黃連解毒湯四貼後

服涼膈散合四物湯六貼即愈此婦因悲哀太過則心悶急肺布

葉舉而上焦不通熱氣在中血走而崩故效

薛氏曰一婦人年將七十素有肝脾之證每作則飲食不進或胸

膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余用逍遙散加山

梔伏神遠志木香而愈後憂女婦肩不時吐紫血其病每作先倦

怠而後發熱經曰積憂傷肺積思傷脾肺布葉舉是令子母俱病

不能攝血歸經而致前證遂以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二

分頓愈後因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脫也法當補氣乃用

人參一兩麥冬當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢炙草木香各

婦人年六十四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內作痛服流氣飲之



方症合宜而  
以四劑全消  
恐無是速

當去脾熱在  
風而下陷者  
宜用防風  
條苓是大腸  
經藥用柴胡  
則治厥陰

一錢二劑頓止

一婦人年六十四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內作痛服流氣飲之類甚不時有血如經行又大驚恐飲食不進夜寐不寧乳腫及兩脇痠痛如炙午後色赤余以為肝脾鬱火血燥先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢山梔一錢半二劑腫痛頓退又二劑而全消再用歸脾加炒黑梔貝母諸證悉愈

一婦人因怒弱血久不已面青黃而或赤此肝木制脾土而血虛也用小柴胡合四物以清肝火生肝血又用歸脾補中二湯以益脾氣生肝血而瘥此證若因肝經有風熱而血不寧者用防風一味為丸以兼證之藥煎送或肝經火動而血不寧者用條苓炒為丸以兼證之藥煎送無有不效

芍藥、槐、膽、是、厥、陰、藥、未、扶、是、平、肝、藥、脚、振、兼、肝、故、用、法、如、此、若、血、分、有、熱、當、加、丹、皮、山、梔、

一婦人性急，暴怒，非太陽耳項，喉嚨乳作，頸脇胸膈，吞酸吐瀉，少食，經行不止，此皆肝火之證。肝自病，則外證見；土受剋，則內證作。若自病，見用四物加白朮、茯苓、柴胡、炒黃連，諸證漸愈。惟月經不四，君子加柴胡、芍藥、神麴、吳茱萸、炒過黃連，諸證漸愈。惟月經不止，是血分有熱，脾氣尚虛，以逍遙散，倍用白朮、茯苓、陳皮，又以補中益氣，加酒炒芍藥，兼服而調。

○論氣陷血脫法當升舉

東垣云：一婦人經候黑血，凝結成塊，左脇有血痕，水瀉不止，穀食有時化，有時不化，至今歲四月，血塊暴下，併水注俱作，是前後二陰有形之血脫竭於下。既久，經候尤不調，水瀉日見三兩行，食罷心煩不快，飲食減小，甚至瘦弱。東垣先生曰：夫聖人治病，必本四

治之大法，必先虛無，無伐天利，無盛成血，無虛風，無過人天，無致邪。



陽盛、是言陽邪盛於內故可下陰盛是言寒邪盛於外故可汗

時升降沉浮之理。權變之宜。若不本四時以順爲道。非其治也。且治之大法。必先歲氣。無伐天和。無盛盛。無虛虛。道人天殃。無致邪。無失正。絕人長命。故聖人云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之則愈。下之則死。大抵聖人立法。各自有義。且如升陽以發散之劑。是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣。此病是也。常用此法治之。乃升降浮沉之至理也。夫天地之氣。以升降浮沉。乃從四時。如治病逆之。則殺人矣。故經云。順天者昌。逆天者亡。可不畏哉。夫人之身。亦有天地四時之氣。不可止。認在外。人體亦同天地也。今經漏不止。是前陰之氣血已下脫矣。水瀉又數年不愈。是後陰之氣血又下陷矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之門戶。俱下竭。是病人周身之氣。常行秋冬之令。陰

甲膽也

風勝濕是  
舉下陷之氣  
今人以爲風  
來則乾之意  
非也

海陰經

主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人身之中合氣  
升浮者穀氣上行是也既病則周身血氣皆不生長穀氣又不升  
其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元陰真脫血氣消竭  
假令當日元是熱證今下焦久脫已化爲寒矣此病久沉久降寒  
濕太勝當急救之瀉寒以熱降濕以燥大升大舉以助生長補養  
氣血不致偏枯聖人立治之法云濕氣大勝以所勝助之助甲風  
木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當調和胃氣次用  
白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此之  
謂也此便是大舉大升以助春夏之濕久陷下之至治也又一小  
云此病次用四物隨濕證加減

○論血瘀腹痛法當收止

能行非先  
狀非一  
所感亦異  
是則頭目昏  
暈四肢厥冷  
宜膠艾湯  
喘逆氣喘



震氏丹能止  
能行非死  
不能道不能  
明

於此特見

總論

非久崩氣脫  
者不可用

以下皆止溢  
之法而蟹殼  
黃麻又有破  
血之能

云此丹能止崩中或清或濁或純下瘀血成腐勢不可止證

戴氏曰血大至曰崩中或清或濁或純下瘀血成腐勢不可止證  
狀非一。所感亦異。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。竝宜膠艾湯。嘔震靈  
丹。佐以三灰散。或以童子小便煎理中湯。或以沉香降氣湯。加入  
百草霜。米飲調下。血崩甚而腹痛。人多疑惡血未盡。又見血色瘀  
黑。愈信惡血之說。不敢止截。大凡血之為患。欲出未出之際。停在  
腹中。即成瘀色。難盡以瘀為惡。又焉知瘀之不為虛冷乎。若必待  
見瘀血之後。截之。恐併與人無之矣。此腹痛更有說。瘀而腹痛。血  
通而痛止。崩而腹痛。血住則痛止。宜芍歸湯加乾薑熟附一錢。止  
其血而痛自止。仍以刺花繡拭黑片。燒灰研末。米飲調下。一方以  
毛蟹殼燒存性。米飲下。亦有以旱黃麻根。燒灰為末。米飲下。  
○論過服寒涼法當溫補

種種得效如  
此治法自有  
知者

因怒發熱不  
主于肝而專  
溫補脾胃此  
得治本之道

薛氏曰：表弟方健甫，內五十歲，辛丑患血崩，諸藥同効。壬寅八月，身熱體痛，頭暈涕出，吐痰少食。衆作火治，屢轉發熱，絕粒數日。余診之曰：脾胃久虛，過服寒藥，中病未已。寒病復發，宜用八味丸料一服。翌早遂索粥數匙，再服食倍，熱減痛止。乃服八味丸而愈。癸卯秋，因勞役憂怒，甲辰夏病復作，胸飽發熱，脊痛腰疼，神氣怫鬱，或作中暑，崩血便血，煩渴引飲，粒米不進。昏瞢時作，脉洪大，按之微弱。此無根之火，內虛寒而外假熱也。以十全大補加附子一劑，遂食粥三四匙。崩血漸減，日服八味丸，始得全愈。

大尹王天成之內久患崩，自服四物涼血之劑，或作或輟。因怒發熱，其血不止。服前藥不應，乃主降火，更加腹脇大痛，手足俱冷。余曰：此脾胃虛寒所致。先用附子理中湯，體熱痛止。又用濟生歸脾



然以前中果  
之症方藥過  
別又就其理  
均一寒涼過  
劑而方藥厚  
用不同然皆  
不拾姜附是  
必有道交兩  
服之而愈  
不聽而然可  
不知所集之  
意哉

審証細蜜曰  
是老手

補中益氣二湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣  
錦衣楊永興之內患前證過服寒涼之劑其證益甚更加肚腹痞  
悶飲食不入發熱煩躁脈洪大而虛余曰此脾經氣血虛而發躁  
也當急用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不救不信乃服止血降  
火之劑虛證蜂起始信余言緩不及泊矣

○論補中去積

東垣云丁未年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾殞身失  
血自後一次經數日而來今次不止其人心窄性急多驚以予料  
之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容到彼診得掌中  
寒脈沉細而緩間有沉數九竅微不利四肢無力上喘氣短促口  
鼻氣皆不調果有心氣不足飲食失節脾胃虛弱之證胃脘當是

前是虛此是實

此值尤如尤難

又得一種見解人嘗謂丹溪先生苦治痰然哉

梁氏維

卷一

二

而痛在胸下急縮有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難諸虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去與安心定志鎮壓其驚調和脾胃大益元氣補其血脈養其心脾以大熱之劑去其寒疑在皮膚少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱製黃芪當歸人參湯

○論開痰行氣

丹溪云涎鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開涎不足以行氣其氣升則血不能歸隨道此論血泄之義甚明蓋開胸膈濁涎則清氣升清氣升則血歸隨道不崩矣故其症或腹滿如孕或臍腹疼痛或血結成疔或血出則快止則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣清瘀血

良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小



既云心脾血

虛自當通補

乃不為治本

即用烏賊失

笑以治標何

即

論解得當至

云心血虛止

用芩歸似未

盡善觀後案

便得真旨

論殺血心痛

良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏賊魚骨炒為末醋湯調下失笑散亦効

薛氏曰前證若陰血耗散用烏賊丸收斂之若瘀血不盡用失笑散行散之若心血虛弱用芩歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯調補之

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證具面色痿黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

論崩漏雜治法

丹溪云崩漏有虛有熱則下以熱則通流

氣虛血虛者以四物湯加參芪

因勞者用參芪加升補藥

因寒者用乾薑

因熱者用黃芩

崩下乃熱而虛四物湯加清蓮

崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止

紫色成塊者血熱四物湯加黃連梔胡之類

急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者標罷後用四物湯加

炒黑薑調理

經驗簡要治崩中證（冷者脉緊細手足寒紅去淡黑或五色

脉洪四肢溫心煩口苦燥熱血沸而成用黃芩湯荆芥散或生用心



後赤者血熱  
白者氣虛

當歸建中加白龍骨血竭附子下紫石英丸震靈丹炙火○熱者  
脉洪四肢溫心煩口苦燥熱血沸而成用黃芩湯荊芥散或清心  
蓮子飲加竹瀝生地黃汁甚者生地黃汁磨京墨百草霜冷服○  
虛者膠艾湯加麥門冬鹿茸龍骨酸棗仁或養榮湯加龍骨血竭  
送震靈丹○實者腹中痛煮附丸四物湯加香附子心虛者恍惚  
多夢健忘舌強小便多面紅盜汗柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨京  
墨百草霜吞靈砂丹又靈砂當歸蓮肉龍骨製肉丸參湯送下崩  
中麝香當歸崩者心氣已散急服靈砂龍骨等○有田婦崩中斷  
下者用大燕根酒煎清早服生麥中如蓬蒿花  
或云即薊根也  
產寶分陰崩陽崩一受熱面赤謂之陽崩一受冷面白謂之陰崩

脉法

減即小也

氣香附理肝  
之荊芥升肝  
環陰器而  
况厥陰之經  
能截而崩也  
于下故血不  
不升則枯也  
血崩升肝

婦人經水

一

二

脉經曰問血崩何等煩師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳津黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如衄血也○寸口弦而大弦則為滅大則為芤滅則為寒芤則為虛寒虛相搏脉則為芤婦人則半產漏下○尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏白下赤○漏血下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者死○漏下赤白日久下血數升脉急疾者死遲者生

○治血熱崩漏

荊芥四物湯 治崩漏初起不問虛實服之立止

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

荊芥穗

條茶

香附子

炒各一錢

右剉水煎服○如不止加防風升麻白朮蒲黃○一方加地榆

奇効四物湯

治肝經虛熱血滿腫而久不止



氣條今除內  
熱四物生地  
黃藥黃血源  
血故皆取効

此方用熟地  
以補肝之甘  
以阿膠黃芩  
益肝之氣及  
氣溫下元以  
助真氣之升  
所謂陰從陽  
起也  
洪虛若氣不  
足紫黑者血  
之熱黃芪所  
以補氣然氣  
盛則生火又  
加天冬地骨  
以清氣中之

尤効○一方四物加蒼連梔子黃柏○一方並加膠艾

奇効四物湯治肝經虛熱血沸騰而久不止

當歸酒洗

川芎

白芍藥炒

熟地黃

阿膠炒成珠

艾葉

黃芩炒各一錢

右剉水煎服

河澗生地黄散治經漏下血脉虛洪經水紫黑

生地黄

熟地黄

白芍藥

黃芪

枸杞子

天門冬去心

地骨皮

柴胡

右咬咀水煎服便血者加地榆

涼血地黄湯治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守胞絡相火

故血走而崩也

小熟地所以

生血生而

不涼尤虛妄

行故以生地

黃連以涼心

芍藥甘草緩

肝筋腹紫明

黃芩清肝

麻栲犯熱

又用腎同歸

者也經曰陰

者復陽而陰

起也而陰陰

陰不自升故

諸經之血必

隨諸經之氣

而後升行氣

有所順則熱

迫血而內崩

矣故用黃栲

生地黃

當歸尾各五

黃連

黃芩

知母

桑木

川芎

升麻各二

柴胡

防風

羌活

黃芩

細辛

荆芥

蔓荊子

甘草各一分

紅花少許

右咬咀作一服水煎空心稍熱服

小魚湯

治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令

人下血當補其陰脉數疾小者順大者逆

小蘗莖葉

搗取

生地黃

搗取汁

白朮

半兩

右三件入水一盞煎減一半去渣溫服

芎藭酒

治崩中晝夜不止醫不能治者

芎藭一兩

生地黃汁

一盞

右用酒五盞煮芎藭一盞去滓下地黃汁再煎二三沸分爲三

火之主也散治崩中血不止



以清心火。心者  
絡之主也。故  
又以生地黃  
連以治火之  
原。知母黃芩  
滋水之母。歸  
尾破瘀。紅花  
生血。所謂去  
故生新也。小  
芩行血海之  
餘。蔓則涼諸  
經之血。而風  
藥皆所以  
升諸經之氣  
也。諸經氣升  
則陰血不得  
不隨之而起  
矣。故曰從陽  
而起也。有是

服

治崩中去血不止

大小薊根 五兩

白茅根 三兩

右二味細切。用酒五觔煮取四觔。去渣分四服。

一方治婦人血崩

槐花 半兩

黃芩 二兩

右二味共為細末。每服五錢。好酒一碗。用銅梅銘一枚。聚柴火

燒紅。浸入酒內。調服。不拘時。忌生冷油膩之物。

金華散 治血室有熱。崩下不止。服溫藥不効者。

玄胡索 當歸 瞿麥穗 牡丹皮 乾薑 各一

石膏 二兩 桂心 另 藏靈仙 各七 蒲黃 牛兩

瘕者法之

此方以酒煎

莒蒨醃生地

汁自有妙用

甚奇其奇

用酒之意便

是升法

此方用石膏

以陽明為血

海也而乾薑

桂心為之從

治瘕見仙方

腸中宿腸強

水雖敗而

清熱結而

者可用

與奇效四物

少靈彼用黃

右為細末每服三錢水煎空心溫服日二次

簡易黃芩湯

治崩中下血今人多用止血補血之藥惟此方治

陽乘陰所謂天若地熱經水沸溢者

黃芩一味研為細末每服三錢辟瘟酒調下即燒碎鍾酒

一方荆芥湯煎下

○治勞傷崩漏

膠艾四物湯治勞傷血氣月水過多或崩漏不止及妊娠胎氣

不安或因損動漏血傷胎者亦宜

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

阿膠炒成珠

艾葉各一錢

甘草炙五分

右剉水酒各半煎空心服

虛弱氣短氣逆自汗不止身熱則亂惡見飲食四肢倦怠大便



彼以水煎此  
又半煎其溫  
涼不同知此

據見證悉屬

脾胃氣虛當

用補中益氣

為主今此方

不用人參升

麻何也蓋不

氣燥煉散其

色鮮紅又何

用之況與地

黃同用豈不

為時人所笑

要知古人皆

因證立方但

求至理所在

而不必拘方

以試病也

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止其色鮮紅先因勞役脾胃

虛弱氣短氣逆自汗不止身熱則亂惡見飲食四肢倦怠大便

時泄

黃耆一錢

白朮

蒼朮

當歸身

白芍藥各一錢

陳皮

熟地黃各五分

生地黃

甘草三分

柴胡二分

右作一服水煎空心熱服

東垣為一婦人製此方一服之後諸

兩旬不止醫者拘而熱之說用四物加參連服治不愈日血

大下昏迷不醒急以問予予曰此藥一劑少頃頓醒過兩時血

遂止後常用此藥其病遂不復作蓋血虛須補氣嘗譬之血

猶水也氣猶陽也陽堅則水不橫決氣固則血不妄行自然之

理也此藥有黃耆最多白朮次之所以神効俗醫不達此理專

用涼藥不知涼藥傷胃服久則正氣愈弱而妄得同故特為表

此為氣猶夫也血消其也

血隨氣升夫喘婦隨之道

耳夫當出中焦脾胃氣虛

是言血失其夫矣此方益

營助脾而以氣藥偽君者

正此意心脾氣虛氣

結者宜之此濟生方也

而宜加柴梔以清厥陰

之火以升肝脾之氣

鹿茸乃陰中

歸脾湯

治婦人思慮傷脾不能攝血以致氣弱行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛忘情嗜臥不思飲食

人參 黃芪 炒 白朮 白茯苓 當歸 龍眼肉

遠志 去心 酸棗仁 炒各 錢 木香 甘草 炙各 五分

右剉加生薑三片棗一枚水煎服○加柴胡山梔名加味歸脾湯

和子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中下血不止

柏子仁 炒 香附子 炒 芎藭 鹿茸 酒蒸焙 扶神 去木

當歸 各一錢半 川續斷 二錢 阿膠 炒 遠志 去心各 一錢 甘草 炙五

右作一服生薑五片水煎空心服

當歸 酒浸 白芍藥 香附 二錢 青皮



在陽陰休而  
湯用也非血  
晚氣衰者不  
川

以大怒而用  
是故曰平肝

香附青皮柴  
胡為藥甘草

川為藥肝肺  
川升提肝氣

常歸生地養  
血藥用然所

重在大怒故  
立方如此

以食增減為

養血平肝散 治大怒經血暴下

當歸 酒浸

白芍藥 炒

香附 炒黑各二錢

青皮 醋炒

柴胡

川芎

生地黃 各八分

甘草 五分

右劉水煎食前服

治崩漏氣陷

益胃升陽湯

血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰

陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能止

血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之一身內穀為寶

黃耆 二錢

人參 有嗽

神麴 炒各一錢半

白朮 三錢

當歸 酒浸

陳皮

甘草 炙各一錢

升麻

柴胡 各五分

生黃芩 二錢

瀉盛暑之伏熱

法

用清涼用升

舉當在不想

飲食上篇

以症屬太

老牛面方

葉子少問

太陰

上在老木

加常山和花

弓ノ山ノ以

升陽

之九

此後月陽

之義也

魚止

卷之四

—

柴胡調經湯

治經水不止鮮血項筋急腦痛脊骨強痛不思飲

卷五

獨活

藥水

升麻

分五

藝木

柴胡連葛根

崇歸身

甘草

三分

紅花少許

石咬阻作一服水煎去渣稍熟空心服微汗立止

調經升陽除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多

下水漿之物皆

飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因

力無氣以動氣



當細思之  
 至陷則溫故  
 怠惰情臥水  
 詩助熱故氣  
 逆上衝故為  
 溫之微弦為  
 木之象鬱而  
 不伸則熱此  
 心火乘脾之  
 意也其脉按  
 之洪大者火  
 在下也見用  
 之下者土之  
 位也胞絡為  
 用火高下命  
 門為多而之  
 總病從火而  
 心火以藏德  
 為神相火聽  
 命于心三焦

飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不時困倦乏  
 力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦按之洪大皆  
 中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脈  
 二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令  
 胞絡代之故曰心之脉主屬心系心系者胞絡命門之脉也主  
 月事皆出脾胃虛而心胞乘之故漏下血水不調也況脾胃為  
 血氣陰陽之根蒂當除濕去熱蓋風氣上伸以勝其濕又云火  
 鬱則發之

黃芪

蒼朮

羌活

各一錢半

防風

藥本

升麻

柴胡

甘草

各一錢

當歸

酒浸

獨活

各五分

蔓荊子

七分

主氣胞絡主血故血分之火專主胞絡氣分之火專主三焦則火不得逐炎上之性迫于血分故陰經傷也此方以熟木丹麻黃太陰陽明之湯柴胡防風達厥陰少陽之本毛姑京不以升舉少陰太陽下部之體所謂下者舉之也是皆升散之物過則氣耗而

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍執服空心服藥畢待少時以早膳服之可一服而已如炙足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已

此藥乃從權衡之法用風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若崩血經而惡物已盡生病雖除後必須以黃芩甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若經血惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

○治崩漏血瘀 昏暈○疼痛

五靈脂散 治血崩不止及昏不省

當歸引地便 右為末每服一錢溫酒調下 一方治血崩不止五靈脂一錢



傷余故又以黃芪以保胎當歸引血使各有所歸并草和氣薊刺涼血此四種者又制充實之法也其口可一服已何其神哉讀者當得此意以升舉上治者以標為本也以此心火為治者以水為主也以益肺胃為治者標本不捨也東垣中土脾胃之意蓋如

五靈脂不何多少炒

右為末每服一錢溫酒調下。○一方治血崩不止五靈脂二錢炒熟加當歸酒同煎或水酒並便各半盞同煎服。○一方五靈脂半生半熟為末酒調服。○一方水煎五靈脂半乾去渣澄清再煎成膏人神麴末為丸如桐子大空心溫酒下三十九便止。○一方每服三錢水酒並便各半盞煎至八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或心腹脇肋脚痛不可忍者或止用童子小便尤佳。○或中風即入草烏頭半錢同煎亦消腸風下血如不飲酒者煎烏梅栢葉湯調下。○如心煩口乾渴者加蒲黃炒減半。○一方同蒲黃各炒等分名失笑散治失血及產後半產惡血攻心昏迷不省及心腹絞痛欲死者其効如

五灵脂行汚 濁之血如神 童便降火亦 行血分而同 煎尤妙

神地生去原 用醋製丹藥 先生書之

產後瘀血心 崩不論久近 服之如神

四法俱良 氣寒則凝而 癥瘕腹痛皆 凝之故

神真救急之良方也人家不可不備。此藥兼能解毒及蛇蝎 蜈蚣咬傷處立愈

香附子散。治血崩不止或成五色亦治產後腹痛及小產血不

止大是婦人仙藥常服益血調氣

香附子 不拘多少春去 毛中斷之略炒

右為細末每服二錢清米飲調下能止血好酒調下能破積。

冷氣黃湯。帶下艾湯入醋少許下

五寶丸。治崩漏帶下積聚癥瘕臍腹疼痛門疼痛條

傳金散。治婦人血崩不止

香附子 炒四 常歸尾 二兩 五靈脂 炒

有為細末每服五錢醋湯調下空心服立效



胸体通氣溫  
呼苦辛以  
八血分辛以  
散氣氣行  
血流故痛自  
止  
崩而內有瘀  
者且之  
數方皆用破  
血之劑  
良喜妙

如神散 治血崩不止赤白帶下

香附子炒

赤芍藥炒各等分

右為末入鹽一捻水煎食前溫服  
一方用香附白芍為丸

立効散 治婦人血崩臍腹痛

香附炒三兩

當歸一兩

赤芍藥

良薑

五靈脂各半兩

右為細末每服三錢酒一盞重便少許同煎服

一方 治血崩臍腹痛

當歸

赤芍藥

熟地黃

香附子

牡丹皮

木賊

去節各二兩

沒藥

丁香

桂

去皮各三錢

右為細末酒調三錢溫服

縮砂散 治血崩

縮砂不拘多少於新瓦上炒香為細末米飲調下三錢

加減四物湯治室女二七天癸至亦有當時未至而後至者亦

有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜

服之

四物湯

四錢

香附子

炒去毛  
錢半

有加重五斤水煎食前服如血色鮮而不止者去熟地黃

加生地黃

去熟地黃可  
不患之

○治崩漏虛寒

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所致

經隔小時其脉兩尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺脘下如

水求厚衣被以禦其寒白帶自滑之物雖多聞下如星漏水下

與前所論脈  
證必析宜分  
之



以寒多故用藥必溫

服藥有法有時

時有血不多。右尺脉時微。水多暴下者。是急弦脉。為寒多。而洪脉時見。乃熱少。合而言之。急弦者。北方寒水多也。洪脉時出者。命門包絡之火也。黑物多赤物少。合成屋漏水之狀也。

當歸一錢二分

白芍藥熟地黃各二錢

川芎

丁香

各四分

阿膠

炒六分

生艾葉一錢

後入

右為細末。作一服。水二盞煎至五沸。去滓。入膠艾。再上火煎至

一大盞。空心。飯食前。盡帶熱服。三服。效。

芎藭湯。治帶下。漏血不止。及風寒。冷熱。勞損。衝任。月水不調。崩

中。暴下。腰重。寒熱。淋瀝。不斷。及產後失血過多。虛羸。腹痛。或妊

娠。胎動不安。下血。連日。小便頻數。肢體煩倦。頭暈目眩。不欲飲

好加減

此在氣虛二

字

此即膠艾四

物之變局也

彼有芍藥此

有人參烏雞

乾薑大藥局

在肝氣下發

者宜易藥之

酸寒以收之

氣脫而不溫

者宜參差焉

鐵之類溫補

而溫之阿膠

者益金木以

成此藥之用

也

食

芍藥

黃蓍

芍藥

乾地黄

吳茱萸

甘草

當歸

乾薑

石以水一斗煮取三升分三服。若月經後因有赤白不

止者。除地黄。吳茱萸。加杜仲。人參各二兩。

斷下湯。治衝狂氣虛崩中漏下經脈不調。每遇月候時來。臍腹

腰脚先痛。漸減飲食。四肢乏力。及帶下三十六疾。悉能療之。

人參

熟地黄

艾葉

烏雞骨

當歸

阿膠

川芎

乾薑

有咬咀。水煎。食前服。

烏雞骨即海螵蛸

加味四物湯

治崩漏



虛則熱故以此主之。腹痛一症，人皆以為瘀血者多，而此以為漏不止者服。熱附丸，正元禮所謂崩而腹痛者，崩止而痛除也。

此濕瀦之劑也。入前漏於者宜之。丹溪以紫黑為熱，而此言瘀黑者，乃下焦氣寒，白凝而黑，各有其法。然女子氣

四物湯 一兩

人參 二錢

熟棗 一錢

右剉碎，每服半兩，薑棗煎食前服。五六服，寒熱腹痛皆退。崩漏未止，續服後熟附丸。

熟附丸

熟附子

木賊 去節

龍骨 煨

赤石脂 煨各半兩

川芎

當歸 各一兩

石為細末，醋糊為丸，如桐子大，每服五六十丸，食前米飲下。

鹿茸丸

治經候過多，其色瘀黑，甚者崩下，呼吸少氣，臍腹冷極。

則汗出如雨，尺脈微小，由衝任虛衰，為風冷客瑛胞中，氣不能

固，可灸關元百壯，在臍下正中二寸。

鹿茸

煨去毛

赤石脂 煨

禹餘糧 煨各一兩

法然女子氣

治崩漏血於胎前產後諸方三

當歸

熟地黃

續斷各二兩

附子炮

艾葉一方無

栝葉各半兩

海在上而凝在下故下焦溫而後氣升血行如鹿茸者以通成形由氣而長而隨氣上而成角故人血分以生焉又以

丸亦可

○治崩漏虛脫

大千方。治崩中下血不止小腹痛

芍藥二兩炒黃

栝葉六兩微炒丹溪云栝性多燥

右用水一升煎至六合入酒五合煎取七合空心分為二服一

方為細末酒調二錢。一方有鹿角膠等酒調治白帶臍腹痛

柏黃散。瘕瘕血不止

黃芩一兩二錢半

側柏葉

蒲黃各兩

之原血可思

右吹里水二升煎取八合分為二服



以柏葉為本

荷葉為主但

清涼之物

治肝血脫

不為血脫

即小腸血

是血虛妙在

用柏此亦殺

邪有生机也

鹿膠四鹿茸

意妙此

本清肝熱更

培土元

血片雞肝色

是血不足而

瘀故其色淡

澤此其窮所

以為君也

伏龍肝二兩即空  
心對力士

右咬咀水二升煎取八合分為二服

又方治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭十二分 生地黃 伏龍肝各十  
分 阿膠 青竹茹各八分

當歸六分 續斷 地榆 小蘗根各一分

右用水九盞煮取三盞去滓分三服

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脉虛經云非時忽然崩下或如豆

汁或成血片或五色相雜或赤白相兼膀胱痠痛經久未止令

人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 赤石脂各一兩 芎藭三兩 熟地黃

艾葉微炒各二兩 麥門冬去心兩半 當歸 乾薑各一錢半

醫陰綱目 卷二 治崩漏血瘀昏暈癰痛等症 仁生

肉桂

甘草 各半兩

右為鹿末 每服四錢 棗一枚 水同煎

地榆散 治婦人崩中 漏下不止

地榆

蒲黃

白芍藥

白茯苓

栝葉

微炒

蟹爪

微炒

熟地黃

鹿角膠

碎炒

漏蘆

各一兩

芎藭

當歸

各七錢半

伏龍肝

一兩半

乾姜

炮

桂心

甘草

各半兩

右剉碎 每服三錢 水一中盞 入竹茹一分 煎至七分 去滓 食前

溫服

按伏龍肝為止血之聖藥 蓋燥可去濕也 先賢治崩用旋覆花

半夏 治膈間濕痰 而崩止者 亦此意

此方有溫育 涼其破瘀止 痛莫如蟹爪 而補血上行 莫如角膠 其餘可三反矣 漏若人陽明 最妙 旋覆花夏之 治崩止治痰 高之治等若 果明痰而崩 不難用此則 生此血藥之 人也 此方溫治燥



高止血破血之劑也

又可治白帶

前方溫下元

以止血此方

調血氣以燥

瘡目是不同

此又無千年

二字而用油

炒切意燥熱

也露露之氣

乃燒研細投

酒中之東小

或取其甚脆

之速耳

蠶甲是下部

陰葉而通官

脉之陽脊

齊前節而

以至子陰

蒲黃散 治胎中不能止

蒲黃 炒 破故紙 炒 千年古石灰 炒過各等分

右為細末 每服二三錢 淡酒或醋湯調下

霹靂散 治經脉凝

香附子 三兩 川芎 石灰 一兩 炒各

右為細末 燒秤 錘碎 酒調服二錢七

聖耳散 治崩中漏下不止 虛損羸瘦

鹿茸 一兩 去毛 塗 白龍骨 鱉甲 塗 酥炙令

熟地黃 白芍藥 白石脂

烏鰂魚骨 炙黃 續斷 各一 肉苁蓉 一兩半 酒浸 去皮炙乾

右為細末 每服二錢 食前粥飲調下

莖藜是下部  
陽藥有益坎  
中之陽而補  
真火故曰黑  
司命石其餘  
可類而推矣  
若脂從容  
又為其藥之  
助云爾

蚕食桑而糞  
砂有清香涼  
燥之能里服  
之亦能以頭  
二為佳為

補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸崩漏帶下

白薇 牡蠣 白芍藥 鹿角霜 山藥

白朮 白茯苓 烏鰂魚骨 白芷

各等分

右為細末麵糊和丸如桐子大每服五十丸空心米飲送下

牡蠣丸 治月水不止眾藥不愈者

牡蠣火煨研細用醋調成丸再煨過通紅候冷研細出火毒

却用醋調艾末熬成膏和丸如桐子大每服五十丸醋艾葉

下

一方 治婦人血崩

蠶砂炒一兩 伏龍肝半兩 阿膠一兩

右為末空心溫酒調服二三錢大舍名無比



也。有生之

○血見黑則止

黑金散。治婦人血氣虛損。經候不調。崩中漏下。

鯉魚皮

棕櫚皮

黃牛角腮

破故紙

亂髮各兩

烏鰂魚骨

乾薑

木賊

當歸

熟地黄

各半兩

右剉碎。拌勻。入磁罐內。鹽泥固濟。候乾。以炭火五斤。服令通赤。烟盡。取放土內。埋令冷。取出。研細。每服三錢。入麝香少許。空心。米飲調下。

五灰散。治下血不止。成血崩。

蓮蓬殼

黃絹

血餘

百草霜

五灰十灰皆取其黑如白

棕皮燒灰以上共

山梔炒黑

蒲黃炒

黑黑

右爲細末調服或煉蜜丸桐子大清米飲下五十丸

十灰散  
治下血不止

錦片

木賊

櫻欄

栢葉

艾葉

乾  
漆

魚鱗  
魚鱗  
魚鱗

鯉魚

血餘

常

已上逐味火燒存  
性名等分研末

鹿麝香

研少許

右研勻每服二錢空心溫酒調服。

十灰丸 治崩中下血不止

錦灰

編一

黃絹灰

馬尾灰

艾葉灰

藕節灰

蓮房灰

油髮灰

赤松皮灰



食藥而吐絲  
扶桑之木受  
青陽之氣稟  
少陽升生之  
性能和肝胆  
之陽以養厥  
陰之血故神  
仙一切服食  
藥不得桑葉  
煎不食以其  
火不文不武  
而只溫性之  
氣益神治崩  
止血豈漫言  
哉百草霜乃  
百草之烟靈  
亦松烟所造  
草休乙木之  
陰味多白松  
有清氣之操味  
多滴取之以

櫻欄灰

蒲黃灰 各等分

右研勻用醋煮糯米糊和丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心米飲下

如聖散 治血止崩

櫻欄

烏梅肉

乾薑 一兩五錢 炮燒存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患不週三服愈方去乾姜用甘草二寸半生半熟共為末二三錢淡醋

湯調服

當歸散 治婦人血崩不止 理氣血而又 瀉血者也

當歸

龍骨 燒赤

香附子 炒各 一錢

棕毛灰 五錢

烟則上升取之以黑煎制火松皮灰亦此意諸魚鱗火而升居水中是水中之火惟鯽魚生干四旁故得土之多其臭腥腥先入肝以助肝氣之升鮮甲者金之用也水中用火水中有金金土救過火土生金木併之意馬尾灰馬者乾之陽尾者血之尾血潤下而

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩豬魚雞等物

當歸

白芍藥

乾薑

櫻櫚各等分

右各煨存性研為細末醋調以有節朱筋左攪四十九轉食前服

琥珀散一名烏紗帽散

治暴崩不止

赤芍藥

當歸

香附子

乾荷葉

男子髮

皂莢水洗櫻櫚

烏紗帽

是漆紗頭巾取陽氣上衝故也

右各等分並於新瓦上煨成黑灰存性三分為細末每服五錢空心童便調下如人行十里久再進一服即止○若產後血去多加米醋京墨麝香少許



生是生于陽體之盡處是陽中之陰也以陰虛之餘生于純陽之休又有陰中有陽之義凡血脫于下乃陰無陽以升此借陽中之陰以鼓陽升陰又借其灰以為止過之用皆良法也此方以血藥入乾姜有從治之妙而左攪四十九轉寓少陽生數

一法先以五積散加醋煎投一二服次服五靈脂散

立應散

治婦人血海崩敗又治腸風下血

香附

生三兩一分

櫻皮

一兩一分

右為細末每服五錢酒與童便各半煮煎七分溫服無時如腸風不用童便

立効散

治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

各一兩

右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為末每服三錢溫酒調服

必効散

治婦人月經不調及崩漏不止

棕皮

燒

木賊

去節燒存性各二兩

麝香

一錢另研

法之義亦由

法

荷葉清芬可

以升肝胆之

氣而清血烏

紗染五倍故

能止血又有

生熟可以破

瘀取當用者

陽升之意

腸風不用單

便似有前後

之分

蓮花心性瀉

而君可以通

心氣之和而

瀉血

涼而能止

右為末酒服二錢空心服

烏金散治血崩不止

櫻櫚毛燒存性

龍骨煨過

右為細末研勻每三錢空心好酒調服二服立止

香礬散治血崩

香附子醋浸一宿炒焦存性為末一兩

白礬末二錢

右研勻米飲調空心服神効一方用荷葉調尤妙

一方治婦人血崩下止

槐花一兩

櫻毛灰五錢

右為末水二盞鹽少許煎至七分去滓溫服○一方用陳槐花

一兩百草霜半兩研細燒紅淬酒下一二錢○一方槐花萼燒



薄而能止

灰溫酒調下二錢七。○一方桃水耳燒作灰酒服方寸七。

止崩雜方

一方荆芥蓮房各等分燒灰存性為細末空心米飲調下二錢

荆芥入肝清而升舉乃血中要藥

一方荆芥穗燈火燒焦為末每服三錢用童便調下

葫茹未解

一方葫茹去子糠實荆芥穗燒存性米飲調服

一方香附子去毛炒焦黑存性為末熱酒調服二錢不過兩服立止

一方砂仁新瓦炒黑為末米飲調服

一方益智仁炒黑為末鹽米飲調下

一方檳榔燒灰存性碾末溫酒調下甚妙

一方亂髮鼠角水洗淨為末空心酒調下二錢

一方、櫻欄燒存性、為末、酒調二錢。

一方、櫻欄燒存性、淡酒調下三錢。

一方、烏梅燒灰存性、為末、烏梅湯調下。

一方、桂心燒存性、為末、米飲或酒調下一二錢。

一方、桃仁燒灰存性、研細、食前溫酒調下二錢。

一方、五靈脂炒令烟盡、為末、溫酒調下一錢。

一方、黃牛角腮用尖、燒為黑灰、微存性、研末調服。

一方、鹿角燒灰細研、食則溫酒調下二錢。

一方、烏鰂魚骨燒存性、為細末、每二錢煎水、賊湯下。

一方、以鹽白梅燒灰存性、為末、空心米飲調下。

一方、用夏枯草燒存性、為末、米飲調下。

夏枯草是厥  
公經養居之

一、方、京里為末二錢、同建元路蜂房為末二錢、酒調服。



藥

用狗膽汁甚

可然亦陽中

陰藥也同百

草霜必妙必

妙

棉子煖下元而止血

無故二字當詳

九竅一竅絕是理

一方百草霜二錢狗膽汁拌定分作二服當歸酒調下

一方京墨為末二錢七同燒露蜂房為末三指撮酒調服

一方新綿一口燒研末空心酒調下立止笑散

一方蓮蓬燒灰存性為細末酒調下二錢

一方棉子花銅器炒烟盡為末空心溫酒調下二錢

一方用大薊俗呼為馬茨芥連根去土勿洗以磁石器搗爛仍入

冷水半盞取汁服之立止

千金方治婦人無故尿血

龍骨二兩為末以酒調服方寸七

孫真方治九竅出血

荊葉搗取汁酒和服之

濟陰縣志卷二終

關中  
武之望叔卿父顯著  
武林  
汪  
瀨洋子父訂正



濟陰綱目卷之三

關中 武之望叔卿父輯著 武林 汪 灝洋子父訂正

西陵 汪 淇懌子箋釋 天都 查 望二周父泰閱

赤白帶下

論帶下由勞傷衝任

凡巢氏所論不可稽者什九即此亦無徵治之法何可憑也  
有  
倍字作帶字  
三句透徹

嚴氏曰巢氏病源論婦人有三十六疾者七癥八瘕九痛十二帶下也而帶下不顯其證今人唯知赤白二帶耳此由勞傷衝任風冷據於胞絡婦人平居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脉右手尺澀浮為陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血

宗脈經語

雖分三十六  
種經是冷熱  
微其所以故  
後人以以赤  
白二症總之

所致其脉寸口弦而大弦則為減大則為乳減為寒乳為虛寒虛  
相搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不  
可治

產寶云帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固謂之三  
十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二者如青血三者如  
紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清  
血似水十如米泔十一如月泥十二如經度不應期也九痛者一  
陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿  
來時足痛七汗出陰中如蟲齧痛八脇下皮痛九腰痛七害者一  
害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害睡五傷者二竅  
孔痛二寒冷痛三小腹痛四臟不仁五子門不正引背痛三固者



胞門子宮口也  
子宮俗所謂  
兒嗎也其傳  
臟有微傳腑  
無症豈二而  
一與又曰病  
生于帶則臟  
腑之說似屬  
空文蓋以帶  
脈束諸經  
故總結之  
其治一也  
心包絡與胞  
門不同其曰  
燠者  
即非包絡豈  
胞門與包絡  
同也白帶痛  
風以下兩方  
皆丹溪所定

月水閉塞不通其餘二者文缺不載而仲景所說三十六種疾皆  
由子臟冷熱勞損而來下起於陰內也

○論帶下五色因風邪入於胞門

良方云婦人帶下其各有因經行產後風邪入胞門傳於臟腑  
而致之若傷是厥陰肝經色如青沉傷手少陰心經色如紅津傷  
手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經  
黑如衄血人有帶脈橫於腰間如束帶之狀病生於此故名爲帶  
李氏曰平時陰陽過多及產後亡血不虛風邪乘虛入於胞絡宜  
煖宮丸加薑附吳茱萸或黃耆建中湯去桂加當歸水煎吞苦練  
丸○白帶兼痛風者一陳湯加蒼柏南星牛膝川芎兼頭風鼻涕  
者蒼柏辛芎散

然導主于濕  
痰並無風冷

入胞之治豈  
前人之昇

也亦補未備  
耳

此指任帶二  
脉而言其口

熱入大小腸  
之謂無據當

從邪入包門  
致傳臟腑結

于帶脉之說  
為正

發免結之義  
以明濕熱之

端

○論帶下屬濕熱免結不散

保命集云亦者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脉

故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脉虛結熱風滯于

帶故女子臍下痛陰中綿綿而下也經曰任脉為病男子內結七

疝女子帶下瘕聚王註云任脉自胞上過帶脉貫于臍上故男子

內結七疝女子帶下帶脉起於季脇章句似束帶狀今濕熱免結

不散故為病也經曰脾傳之腎各曰疝瘕小腸免結而痛出白一

名曰蠱所以為帶下免結也免屈者屈滯而病熱不散先以十棗

湯下後服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣

潔古云治帶下免結而痛者先以十棗湯下之次服苦練丸大延

胡索散調之是先攻後補之法也湯是難病痰飲大延胡

素散方見產後腹痛條



脈証俱實  
熱而曰寒  
者蓋為敗  
之液既聚  
痰則與木  
不相和故  
積之久而  
成冷物口  
寒痰苦因  
病人自其  
其冷而三  
脈亦有熱  
者不可不  
明也  
酢水酸水  
也  
豈屬寒耶  
腎土秘藏  
乘之則熱  
之性失矣  
故不能秘  
藏也  
帶下絕其  
上源之法  
妙甚

○論帶下痰實宜吐下

子和云一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有久得六七至常上熱口乾脰痛時嘔酢水予知其實有寒痰在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈

忌城李左衙之妻病白帶如水竅漏中綿綿不絕臭穢之氣不可近而黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石毓黃薑附之藥重重燥補汚水轉多戴人斷之曰此帶濁水本執業太陽經其寒水不禁因故如此也夫水自而而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下汚水斗餘行三通汗出周身至明旦病人云汚已不下

積痰慾不能  
滲入膀胱苦  
言溫熱則可

方中逆元升

提法惟用芎

一味為四分

升氣之藥

丹溪治帶與

白濁同是男

女之濕熱一

也

矣。次用寒涼之劑服及半載痊一男。

丹溪云。帶與漏俱是胃中痰積流下。滲入膀胱。無人知此。只宜升

提。甚者上必用吐以提其氣。下用二陳湯加白朮蒼朮。仍用九子

肥。人有帶多是濕痰。用海石半畝。南星炒。藜蘆粉。滑石。川芎。青黛。炒。戊

人帶病少。如有多是熱。用炒藜蘆粉。滑石。川芎。青黛。炒。戊

羅先生法。或十棗湯。或神佑丸。或玉燭散。皆可用之。虛者不可峻

攻。實者可行。

潔古云。治結痰白帶。以小胃丹半饑半飽。津液下數丸。候鬱積行

却服補藥。

○論帶下虛寒宜溫補

李氏曰。帶下有虛寒。帶腥臭者。因小水淋瀝不已。或崩中暴下。致

淋漓不已。居  
虛寒。然亦有  
虛熱者。

氣累。帶下于下。其。結。而。成。白。帶。如。此。下。流。則。人。者。皆。由。此。建。中。功。去。



本手氏曰世而下有虛寒帶腥臭者因小水淋瀝不止或朝申早

樂陽虛故悲不

產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升經脈凝滯衛氣下陷精  
氣累滯于下焦結積而成白帶如涕下流腥臭者黃芪建中湯去  
桂加當歸水煎吞苦練丸久不止脾腹引陰冷痛者東垣固真丸  
虛中有火者補經因真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四  
物湯有火加黃芩有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽氣虛  
極帶下腥臭多悲不樂桂附湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用  
酒煮當歸丸小烏雞丸琥珀調經丸

飛龍醫案

韓氏曰山去年三十餘十八胎九殞八夭曾先君松潘雜作賤兄  
弟皆西奔去驚變過甚遂昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉  
下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊曰悲不  
能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥植

用執遺執此  
從治也非其

確兒自不能  
用惜不意斯

有產後下瀉  
上以理中

力以理中  
衣服之而

皆以亦對  
真對假之

意

元氣是先夫

真氣生氣是

後天後氣

也  
老婦服此方

蒸其下則執輩欲絕四弟還脈之始知為亡陽證也大哭口宗嗣

未立幾誤殺吾嫂急以鹽煮大附子九錢為君制以薄荷防風佐

以薑桂芍歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑肝臭熟睡通體覺

即能識人時止一劑子二女相抱痛哭疎戚皆悲執友趙憲長盤

有何術也弟曰方書有之假對假真對真上乃假熱故以俱

冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥反之斯上下和而病解矣

繼後主以女金丹錯綜以二三方不但去其疾且調治元氣庚午

生子一今應襲也壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養

元氣調生氣待飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附

子湯三錢而愈不責効旦暮聞其用女金丹即勝金丸也得之異

人倍加香附而視氣血之偏者又加薑黃條芩倍川芎之屬取効

錄其方俱女金丹以濟人云九月見來手



古菴載而見之

血生千氣故有可兼四君者

三說各主一見凡診治此症當須辨別

此多予念無子者往往有之。翻思予得子之艱其苦何如乃次第錄其方。供女金丹以濟人云。女金丹即勝金丸方見求子。

○論帶久枯涸宜潤補

藥繩云帶下火而枯涸者濡之。凡大補氣血皆所以濡之。如以四物湯為末煉蜜丸梧子大空心米飲下三四十丸以療年高婦人白帶良驗皆潤劑也。

○治帶下當以壯脾胃升陽氣為主

薛氏曰徐用誠先生云帶下白屬氣而赤屬血東垣先生云血崩久則亡陽故白滑之物下流未必全拘于帶脉亦有濕痰流注下焦或腎肝陰淫之濕勝或因驚恐而水乘土位濁液下流或思慕傷筋痿載人以六脉辨人有力用宜導之法此瀉其實也東垣以

前論五色分

脉微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海

治法此以五

石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前証皆當壯脾胃升陽

法分虛實尤

氣為主佐以各經見証之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風

見的據

濕熱壅滯小便赤澀用龍胆瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六

肥家法

味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香

說為丹溪先

散等藥色白者屬脾用補中益氣加山梔色黃者屬脾用六君子

何著教人泥

加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八

不可輕治而

珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃

火濕二字終

藥氣虛痰飲下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火

此穩當之言

而以燥濕瀉火之藥輕治之也

不可輕則瀉

一婦人腹脹脇痛內熱晡熱月經不調肢體痠麻不時吐痰或用

古之十藥子

和之汗吐下

丹之類可輕

服如麻此乃楊慈傷損肝脾用歸脾湯以解脾鬱生脾氣



大無之神作  
玉燭與小胃  
丹之類可輕  
用之與予不  
敢為丹候候  
為欲止今之  
後自下  
立齋得方處  
在認症確求  
創處在不言  
腰惟以二十  
餘年之疾症  
故可用六君  
以神脾治濕  
用六味以治  
水汎為痰皆  
治本而納氣  
清百者也但  
朝夕反用又  
其獨見也

清氣化痰喉間不利帶下青黃腹脇膨脹又用行氣之劑胸膈不  
利肢體如麻此乃鬱怒傷損肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣  
夕用加味逍遙散以生肝血清肝火百餘劑而愈  
一婦人久瘧兼帶發熱口乾體倦用七味白朮散加麥門五味大  
劑煎與窓飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈  
一婦人頭暈吐痰胸滿氣喘得食稍緩苦于白帶三十餘年矣諸  
藥不應此氣虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂朝用六君子湯夕  
用六味地黃丸不月兩愈  
一婦人耳鳴胸痞肉熱口乾喉中若有一核吞吐不利月經不調  
兼之帶下予以為肝脾鬱結用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間  
以四七湯下白丸子而愈

以上七案內  
五症皆治濕  
痰而兼升補  
者以之為名  
盛當時非久  
病必不延之  
故每以升補  
為效學立器  
者須得此解  
不然徒讀交  
書矣

協理之言

一婦人吞酸飽滿食少便泄月經不調服清氣化痰丸兩膝漸腫  
寒熱往來帶下黃白而疲體倦此脾胃俱虛濕痰下注用補中益  
氣倍用參朮加茯苓半夏炮薑而愈

一婦人帶下四肢無力予曰四肢者主也此脾胃虛弱濕痰下注  
以補中益氣濟生歸脾二藥治之而愈

一婦人帶下黃白怒則胸膈不利飲食少思或用消導利氣之藥  
痰喘胸滿大便下血予曰此因脾氣虧損不能攝血歸源用補中  
益氣加茯苓半夏炮薑四劑頓減又用八珍加柴胡山梔而痊

○論帶久不止當補衛厚脾

李氏曰凡崩中下帶或用升提如升陽調經湯或用收澀如伏龍  
肝散白芷散然暫吐而終不止者蓋衛司開闔而為榮血之主脾

扶元氣之便  
方有用桂枝湯加附子以固衛氣者  
君子治物加草果丁香木香



李氏曰凡崩中下帶或用手提或手陽動經絡或用收澀如伊前肝能自止其然暫止而終不止者蓋衛司開通而為榮血之土

不善用古方者每非古方苟能解之便自能用收澀劫奪皆是奇兵用其合宜便是正法此蓋重在正治有可者不可偏廢也

水儲不伸使能生濕關門既能泌別清濁則滑濁之物未必皆為滲入膀胱而從溺道出也如絞腸疝豈由膀胱來

胃為血海水液之會衛氣與胃氣俱虛則血液無所約制是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用芎歸湯煎下或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾使氣血自循故轍而不專于收澀以劫奪之也

論帶下濕熱藥用正治從治之異

方氏曰婦人赤白帶下多是怒氣傷肝夫肝屬木脾屬土肝邪乘脾木氣剋土則脾受傷而有濕濕而生熱熱則流通所以滑濁之物滲入膀胱從小便而出也丹溪作濕熱而用苦寒之藥治之者是矣雖然古人曾有用辛溫治之而愈者不知苦寒之藥正治之法也辛溫之藥從治之法也蓋濕熱拂鬱于內肚腹疼痛赤白帶

耶

讀此論乃見

今古治法不

悖則丹溪之

言亦補先賢

未備之旨

元禮為丹溪

弟子而相皆

如此自是一

種翻案

漏帶之名始

此亦或升神

可愈也

燥溫合煎此

元禮獨創不

讀此使不知

用此

煎

孫氏綱目

卷三

七

下非辛溫從治而能開散之乎然濕熱未曾悞鬱但止赤白帶下

○論帶下雜治法

戴氏曰赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大率下

白帶多固有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍佐艾附丸或米飲

調沙參末帶下不止成疰羸者四物湯加煨牡蠣粉半錢吞固腸

丸多服取效有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下

帶來不再遇停蓄未幾又復傾瀉此名漏帶最為難治○下截之

血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小便澀痛色如白泔

或成沙粒皆不可作淋治用冷劑宜以四物湯五苓飲各半貼和

煎

言三... 症... 未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中



元禮制不  
請便不知  
或成沙粒皆不可作淋瀝用各齊宜以四物湯五苓散各半煎和

陰中執事自  
陽初動也所

言三說誠有

之

此方自芷蔡

根排膿散血

白芍生肌粘

砮燥濕和以

密吸此生肌

托裏之治也

脉經曰婦人

腸中有膿為

榮衛相干血

為敗濁有可

下不可下之

異宜參考之

間下血而以

半產瘀血在

○論室女帶下

產寶云未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中

熱或當風臥或扇風二病者太衝脉盛氣盛則內熱以冷水洗之

三病者或見丹下驚怖者若三者一有所受後必有帶下之証也

方用神仙聚寶丹

○排膿

準繩云帶下並腸有敗膿淋瀝不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷

痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此排膿用白芷二兩葉紅

蜀葵根二兩白芍藥白礬燒枯各半兩為末同以蠟丸如桐子大

空腹或飯前米飲下十丸或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

○消瘀血

卷之八

李氏曰。白淫蓋緣思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。發爲筋痿。久爲白淫。謂白物淫如白精之狀。不可誤作白帶。過服熱藥。又有日夜流津如清米泔。或如黏膠者。謂之白崩。與白淫大同云。



症之類  
自給  
筋疲久為白濁  
又有日久友  
或如  
謂之白  
其白  
其白

經絡者有之  
若婦人則無  
宗筋豈其廢  
道一也究其  
所以似亦不  
以此數方  
治久漏同  
怒火有肝腎  
者為之用  
龍胆瀉肝湯  
之藥用逍遙  
以逍遙有歸  
功養血也  
若論積滯當  
用木鬱達之  
之法

憂思過度所致誠難治療用平補鎮心丸因思傷脾胃者四七湯  
下白丸子或歸脾湯若因少食者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎  
不交者金鎖正元丹小兒經子丸感喜左  
薛氏曰前證若元氣下陷用補中益氣湯脾胃虧損六君子加升  
麻柴胡脾經鬱結歸脾加黃蘗山梔肝經怒火龍胆瀉肝湯虛以  
川加味逍遙散宜與帶下叅看主治  
一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小便頻數時下白淫藥  
久不愈面青口苦予以為積憤而不能發散所致用龍胆瀉肝湯  
而愈川加味逍遙散八珍湯而安

○脉法

脉經云婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿澀則為腹中痛

數則爲陰中疼痛則生瘕弦則陰中墜痛○婦人帶下脉浮惡寒者不怕○

○治濕熱帶下○

清  
白  
散

治

附錄

川芎

白芍藥

炒生地黄

黃梢

鹽水炒

枏根皮

酒具母各  
錢

乾  
重

妙聖

廿四

分各五

右劉加生薑二片水煎

○肥白人冬濕痰加白朮半夏

...

加酒炒條荅荆菴○久

下加熟地黃牡蠣○氣虛加入參黃芪

（）腰痛加鹿角膠

或只以一陳湯加蒼白朮○如升膀胱

之濕加升麻柴胡蒼白朮

解帶散

治血氣不調濕熱白帶四肢倦怠五心煩熱痰癖

此丹溪法然  
謂初似由  
癰入者火者  
非肝膀胱之  
濕諸氣陷之  
也



白此  
四股卷古五心頭丸

十

上滑石利濕  
于下乾姜從  
而燥濕也用  
雨者非  
土下胃中濕  
然故宜方如  
此  
以脉故為用  
黃連白芷不  
用者為其  
燥多也燒  
白芷入陽明  
而利滯止之  
能白米補中  
氣而培土之  
妙其也不言  
喻矣

蒼麴檮皮丸 治帶下

椿根皮二兩 芍藥一兩 蒼米 神麴炒 麥皮麴炒

黃蘗炒各一兩 滑石 枳殼各半兩

右為末。粥丸。桐子大。每五十丸。空心米飲下。

側柏檮皮丸 治白帶因七情所傷而脉數者

椿根皮炒二兩 香附子醋炒 白芍藥 白朮炒各二兩 側柏葉酒蒸

黃連炒 黃柏炒各半兩 白芷燒存性三錢

右粥丸。桐子大。米飲下七十丸。

按椿根皮性涼而燥。濕熱盛者宜之。後一方有黃連香附木香

故可治七情所傷

苦練丸 治赤白帶下甚妙

右為末。和化如糊。了大。每服三五丸。空心溫酒下。○勝面



下部痛者宜

苦練丸 治赤白帶下甚効

苦練碎酒浸

懷香炒一方當歸各等

芍藥炒一方當歸各等

右為末酒和丸如桐子大每服三五丸空心溫酒下○療血

加桃仁○血海寒加桂○如腰腿疼四物湯四錢加羌活防風

各一錢煎湯送下

四神丸

治帶下

此方溫燥非有熱所宜

香附四製

蒼朮甘浸壯

椿根皮密水

砂仁炒各

右為末黃米煮飯丸桐子大每服五六丸空心酒下

已上諸方俱輕劑

萬安散

治女人赤白帶下或出白物如脂或有臭濁污水並神

効

此利氣溫行之劑與寒虛

小茴香炒

木香各二錢

黑牽牛一兩另

取頭末

齊全圖目

卷三帶下諸方

二

相宜

二方皆燥熱  
下氣通水之  
藥性真寒虛  
者宜之

右為細末以生薑自然汁調二錢臨臥服取盡惡物為效未盡  
圓日二服二錢後以白粥補之忌熱毒物

大聖萬安散 治女人癰瘰癧氣腹脹胸滿赤白帶下久患血氣  
虛弱甚黃無力並休息赤白痢疾並皆治之其効不可具述孕  
婦不可服大陰晦不可服

白米 木香 胡椒各二錢半 陳皮去白 黃芩

桑白皮 大通各五錢 白牽牛炒取頭末二兩

右為末每服二錢用生薑五片水一鍾半煎至一鍾去薑調藥  
臨臥服須臾又用薑湯或溫白湯飲三五口催之平明可行三  
五次取下惡物及臭汚水為度後以白粥補之服藥不可食晚  
飯及葷酒等物



清熱滲濕導  
滲妙在氣血  
兩分

日滲入下焦  
則可日入膀胱  
則不可  
總治中州之  
以滲而焦者  
則想虛下流  
故滲自止豈  
有滲入之理

宣明導水丸

治濕熱留于下焦之分赤白帶下不止燥熱煩渴

大黃

黃芩各二錢半

滑石各四兩

右為末水丸如桐子大每服四五十丸滾水下隨證加減

已上諸方俱重劑

治濕痰帶下

滲濕消痰飲

治濕熱痰積滲入膀胱白帶不止

白朮

蒼朮炒

半夏姜湯泡七次橘紅

白茯苓

白芷

香附各一錢甘草炙五分

右制水煎服○有熱加黃芩○血虛加芎歸○氣虛加參芪○

久不愈加升麻柴胡升提之

蒼柏樗皮丸

治肥人白帶是濕痰

此云中焦之濕清下部之熱亦丹溪方也

是導水之猛劑古人能用之今則不能也

白木骨為丸乃今人所製有獨劑之妙可法

蒼朮 黃柏 檳榔皮 南星 半夏 海石

川芎 香附 乾薑炮各等分 〇暑月去乾薑加滑石

右為末醋和丸如桐子大每服五六十丸白湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰及濕痰熱痰並治

婦人結痰白帶惟胃虛少食者忌用

甘遂貼麝末煨熟一方通畏長流水煮晒乾 羌活好醋拌經宿瓦器內燒黑不可焦

大戟長流水煮一時再用 黃蘗炒二兩

大黃濕紙裹煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾一兩半

右為末以白木膏丸如羅蘭子大臨臥津液嚥下五七丸或白

湯送下取膈上濕痰熱積以意思之欲利空心服〇一方加

木香檳榔各半兩



此亦丹溪方  
乃扶肝胃養  
肝陰清熱而  
葵花之用取  
其傾心向日  
之意蓋花性  
暖而用陽一  
入氣分一入  
血分皆使其  
從陽而升帶  
白止也

此方與十全  
大補湯少甘  
芪熟地為其  
甘緩端胃生  
濕勿用也  
然猶風藥而  
云治風邪入  
肌名曰風

補藥方 治痰結白帶先以小胃丹半饑半飽津液咽下數丸候

解開却服此藥補之

白朮二兩 黃芩五錢 紅白葵花二錢 白芍藥七錢 五分

右為末蒸餅丸如桐子大每服三五丸煎四物湯下○一方

有蒼朮無黃芩

○治風邪帶下

胃風湯 治風邪入于胞門或中經脉流傳臟腑帶下五色

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎

芍藥 肉桂各等分

右剉每服八錢八粟米一撮水煎服○腹痛加木香○五積散  
去麻黃亦可

何也

小柴胡少陽

藥其曰治風

邪豈肝胆熱

而生風耶

小柴胡湯 治風邪帶下五色

柴胡二錢 黃芩 半夏 人參 甘草各一

右剉加生薑三片棗二枚水煎服○色青屬肝加山梔防風色

赤屬心加黃連山梔當歸○色白屬肺用補中益氣湯加山梔

○色黃屬脾用六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯○色黑屬

腎用六味地黃丸

蒼朮參芎散 治婦人上有頭風鼻流下有白帶

辛荑 川芎 蒼朮 黃柏 南星

半夏 滑石 杜蠟 黃芩酒炒

右水煎食後服

地榆散 治漏下五色一十二帶兼治嘔吐下血地榆三兩剉碎

此又丹溪先生方也以蒼朮川芎而治頭風以蒼朮半夏而治帶下正無

地榆散主帶下十二日多赤二日多白三日月水不通四日



此下諸病  
然以三  
煎日得單方  
用法果能治  
十三症亦一  
家病也

以下皆以正  
氣為本此亦  
健由法  
以腰痛鼓并  
苦練丸

以醋水各半升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合○本草注云  
地榆主帶下十二病一日多赤二日多白三日月水不通四日  
陰腫五日子臟堅六日子門澀七曰合陰陽患痛八曰小腹聚  
痛九日子門閉十日子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五臟五  
定。

○治虛損帶下

衛生湯 治帶下不止脉微弱腹痛

黃芪 三兩 當歸 白芍藥 炒各二兩 甘草 炙一兩

右為粗末每服半兩水煎空心服○一方下苦練丸三十粒虛  
者加人參一兩

補中益氣湯 治勞役過度飲食不節損傷脾胃以致陽氣下陷

讀東垣先生書方知立方

之旨諸立

先生其父知

善用東垣之

人

補中陽有升

柴以升下陷

之氣此方有

扶冬半夏以

燥中宮之痰

本方補心血

以榮脾補其

母也調肝氣

以和下去其

賊也母補賊

去則脾氣健

矣故曰歸脾

白帶下久不止

黃芪

人參

白朮

甘草

各一錢當歸

陳皮

各七分

升麻

柴胡

各三分

右作一服水煎服

六君子湯

治胃虛有痰飲食減少由氣不和時時帶下

人參

白朮

白茯苓

甘草

陳皮

白朮

半夏

湯炮七次各一錢

右剉一服加生薑三片水煎服

歸脾湯

治思慮過傷心脾以致健忘怔忡驚悸不寐怠惰嗜臥

不思飲食時常白帶不止

方見血崩門

勞傷條

加味八珍湯

治婦人氣血兩虛赤白帶下

當歸

川芎

白芍藥

酒

生地黃

人參

白朮

右剉一服加生薑三片水煎服



脚不食當年  
補心此方其

近之

為總司者也

其山藥杜仲

烏梅又補帶

脈之不足而

加減法亦皆

得理且法之

平而當理亦

可為調經聖

藥宗之

補氣調血強

腰膝腎溫燥

不面黃肌虛

白帶宜冷

藥中正法

加法亦正

加明八珍湯

治婦人氣血兩虛赤白帶下

人參 白朮

白茯苓

山藥炒

杜仲炒

香附炒

甘草分

各五

右加烏梅一箇生薑三片棗一枚水煎食前溫服○肥人加半

夏○瘦人加黃柏○飽悶去人參加砂仁○腹痛去人參加小

茴香○冬月加煨乾薑○日久元氣下陷加升麻柴胡升

提之

當歸澤蘭

治婦人經脈不調赤白帶下久無子者

香附子

用極大子作去毛一斤分四分童便浸四兩酒浸四兩醋浸四兩米泔浸四兩各浸一宿取出曬乾

當歸酒浸

白芍藥

川芎

熟地黃

酒洗

生地黃

各二

澤蘭葉

艾葉

白朮

各一

黃芩

雨半

雨

右為末醋糊為丸如赤小豆大每服六十丸空心白湯或酒下

止帶丸

要思何以因

物中不用用

又以何物

而治其病又

不無立而何

病不無清胃

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

而治其病

當歸酒洗

川芎

白米

人參

山藥

杜仲

薑汁酒炒去絲

香附

破故紙

酒炒

牡蠣

火煨

椿根皮

酒炒

續斷

各等分

青黛

無灰

右為細末

如桐子大

每服五十丸

空心米湯下

○腹痛

加玄胡索

小

○肥人加薑製半夏

○瘦人加酒炒黃柏

○

冬月加炮乾薑

少許

○夏月加黃柏

○

嚴氏當歸煎

治赤白帶下

腹內疼痛

不欲飲食

日漸羸瘦

○

當歸

酒洗

赤芍

酒炒

白芍藥

酒炒

熟地黃

酒蒸

阿膠

炒

續斷

酒洗

牡蠣

各

雨地榆

半

右為末

醋糊丸如桐子大

每五十丸

空心米飲下

○

從蔡究經丸

治赤白帶下

此藥不熱不寒

得其和平

助陰生子

○



川芎調血勝  
以滋榮惟下  
虛者宜之要  
知古人之友  
自自開解不  
然何以男子  
藥而補婦人  
服  
此方以鹿霜  
白芍補血以  
山藥水琴補  
氣以苳薇而  
治崩中淋瀝  
以牡蠣而燥  
濕治帶此又  
別是一種意  
見然不用白  
歸地黃者處  
血藥溫潤也  
變局如此可

肉蓯蓉酒洗 菟絲子酒蒸 覆盆子 蛇床子各一兩

當歸酒洗 白芍藥少 川芎各一兩 牡蠣火燉 烏鰂骨各八錢

五味子 防風各六錢 黃芩 五錢 艾葉 三錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三四十九鹽湯下早晚各進一服

補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形瘦崩中帶下並宜

治之

鹿角霜 白芍藥 百米 白茯苓 山藥

香白芷 白薇 牡蠣蝦 烏鰂魚骨各等分

右為末麵糊丸如桐子大每服五十丸空心米飲湯下

丹溪方 治白帶崩漏陰虛者

龜板炙 枳子各二兩 黃蘗炒一兩 香附子 山茱萸

不匠事制宜

丹溪治帶主

以腎上閉

其方如下

溫中健生

其方如此

宜若本草而

無不可為執

方者一洗塵

此方有起見

非其人不能

必原明理

卷三

一六

苦參

檮皮

貝母

白芍藥

乾薑

錢半

右為末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心米飲下

千金方

治帶下脉數者陰虛有熱也

枸杞根

一斤

生地黄

五兩

一方五斤

右二味以水一斗煮取五升分三服

右二方補腎水真陰虛者宜之

補真固經湯一婦白帶漏久服諸藥不效診得心胞尺脉極微其

白帶流而不止脉訣云崩中日久為白帶漏下多時骨水枯言

崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白帶之物下

流不止是本經血海將枯津液俱亡枯乾不能滋養筋骨以本

經行經藥為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益

肺而救其上焦傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益之元氣



凡東垣立友必原脉原証原藥然後沉思審處且又引前言為証故治病多效今不能然何怪乎病之不瘳也此方以用參薑監陽李仁葵花間燥柴胡升清氣于下陳皮和胃氣中

津液以大辛熱之氣味補其陽也生其血脈以苦寒之藥清其肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣名曰補真同經湯

人參

乾薑

各一錢

生黃芩

另到

郁李仁

去皮尖研

柴胡

甘草

炙各一錢

橘皮

不去白五分

白葵花

十六衆去莖

右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一

盞去滓空心熱服候少時以早膳壓之

助陽湯

治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山

陰中如水

一名升陽燥濕湯

柴胡

一錢二分

以薑二錢

防風

郁李仁

乾薑

甘草

各一錢

白葵花

七衆陳皮

生黃芩

各五分

以真氣為主

耳

服法亦妙

此治重在陰

中如小頻墜

干心故用此

為佐不用參

本意亦非補

也

勝過片湯藥

李可以潤枯

溫燥甘陳和

中生於涼氣

分之熱能與

前方參之口

有見解

前方山多以

氣分藥內加

溫燥之味此

右劉散只作一服水二盞煎至一盞食前熱服

右二方用蔡花郁李仁之滑以潤燥蓋枯潤滑者宜之

○治虛寒帶下

元戎四物湯 治婦人赤白帶下 脉沉微腹痛或陰中痛

四物湯

兩錢

附子

炮各五分

右劉水煎食前服○一方四物加懷香桂

玉仙散 治赤白帶下

乾薑

煨

白芍藥

炒

香附

煨焦各一兩

甘草

生用五錢

右為細末每服三錢月小白酒調下○一方只用白芍藥酒炒

二兩乾薑炮半兩為細末米飲調下二錢

延胡苦練湯 治胎下冷微痛陰冷大寒白帶下

不同之故也

甘草分五兩地黃錢



延胡苦棟湯 治臍下冷微痛陰冷大寒白帶下

延胡索 苦棟子各二分 黃柏一分 附子 肉桂各三分

甘草炙五分 熟地黃錢一

右作一服水煎食前溫服

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂錢一 附子錢三 黃柏 知母各五分

右作一服水煎食遠熱服○如少食常飽有時似腹脹加白芍

藥半錢○如不思飲食加五味子二十個○如煩懣面上麻木

如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢人參七分甘草二分升

麻五分○此補陽氣極虛用黃柏等為引用又升降陰陽藥也

當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

當歸錢二 夏薑 乾薑 附子各錢 柴胡七分

虛黃栢從其

地治臍下之

子以溫寒熱

始痛內桂附

延胡苦棟以

法之

徑庭矣切宜

後方止用四

分之二又相

乾薑用二兩

是大劑大法

是方之師亦

以事制宜也

性之所屬

多悲不樂者

陰晦之象也

故宜桂附以

助陽陽和則

不悲而有樂

矣少以知榮

為從治者思

桂附上也亦

用熱

遠熱之意少

食似腹脹何

以加自費不

思食何以加

五味思之

以薑乾薑太

而臍下冷痛

蠲稍引之就

痛所升柴引

升麻

各五

甘草

炙六

炒黃鹽

分黃柏少

右為粗末。每服五錢。水煎溫服。為丸亦得。○東垣回陽丹註云

必用炒黃鹽。無則不効。蓋寒疝之要藥也。

酒煮當歸丸。治癰疽白帶下注。腳氣腰以下如在冰雪中。居火

坑以厚衣重蓋猶冷。小便不止。與白帶長流。而不禁固。肌肉消

瘦。面白。目青。目慌。慌無所見。身重如山。行步艱側。腿膝枯細。大

便閉結。心下痞悶。懊懣。飲食不下。面垢背寒。小便遺而不知。此

上中下三陽真氣俱竭。故噦嘔不止。胃寒之極也。其脉沉緊。而

澁。按之空虛。若脉洪大而澁。按之無力。猶為中寒之証。况按之

空虛者乎。按之不鼓。是為陰寒之極也。其空虛乃氣血俱虛之

極也。

右四味生。如麻豆大。以水一升。同煎。煮至酒盡。為度。分作八



五期經主  
痛引大引

極也。

左有引上  
升益相引諸

濕陰下陰  
精脈為病男

子七十子  
娘來以願

病在女  
與男子同

當開女  
形如癰突

陰戶是赤痛  
也故云賦

諸症皆寒  
便閉心下痛

懷懷似熱  
凡緊脈者

浮沉均以爲  
寒按之不鼓

無問大小皆  
以爲虛者

當歸兩 黃芩兩 附子兩 皮脂各七錢

右四味剉如麻豆大以好酒一升半同煎煮至酒盡爲度炭火

焙乾同爲細末入後藥

炒黃鹽 丁香各半 金竭三錢 柴胡二錢 升麻根

木香各一 苦練子 甘草各五分 玄胡索四錢

右同爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十九空心宿食消

盡淡醋湯下忌油膩冷物酒麵

暖宮妙應丸 治婦人赤白帶下及子宮虛冷無子者

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 艾葉

牡丹皮 茯苓 龍骨 牡蠣 赤石脂各等分

右爲末麵糊丸如桐大每服五十九空心艾醋湯下

齊合圖目

卷三帶下諸方

十九

常須

既口氣俱

虛木力中

合

氣

藥

當

即世之味

亦未

也功地前滯

陽多故亦不

用

妙在朋四件

用酒煮爰以

酒糊丸煮咬

補下使真

陽生干

九期上千九

天

引之干

鶴頂丸

治帶下之證有三未嫁之女月經初下止而即得或浴

之以冷水或熱而厥或當風此室女病帶下之由有嫁之婦陰

陽過多則傷胞絡風邪乘虛而入胞經觸冷遂成積飲與血水

相連而

體虛而冷入冷風與熱氣相連故成液而下冷則多白熱則

多赤冷熱相交赤白俱下

當歸

七錢半

附子

炮去皮

龍骨

包煨

吳茱萸

湯泡

赤石脂

火煨

乾薑

炮各

牡蠣

一兩二錢

艾葉

半兩以醋

右為細末研勻醋糊和丸如桐子大以赤石脂為衣每服五十

九空心用艾葉食鹽為梅煎湯下

白飲丸

治室女病帶下純白

右為細末艾葉煎湯下打糊丸如桐子大每服五十九空心溫酒



降或倍之于  
升有開結透  
關之妙非精  
識病者定心  
藥石者不能  
到也然其力  
是博夫非淺  
用者不敢  
此方以四物  
合成劑以艾  
葉取其下灰  
參其湯好  
丹其熱宜  
乎子宮溫而  
懷姙矣  
此三十六疾  
之類  
此大執之劑  
非真寒者不  
可服

鹿茸

酒蒸痛  
二兩

白欬

狗脊

煅去毛與  
各一兩

右為細末。艾煎醋汁打糊丸。如桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

神仙聚寶丹

一名琥珀  
硃砂丸

治婦人血海虛寒。如風冷搏結不散。

積聚成塊。或成堅癥。及血氣攻注。腹脇疼痛。小便急脹。或虛鳴嘔吐涎沫。頭旋眼花。腿膝重痛。面色痿黃。肢體浮腫。月候欲行先若重病。或多或少。帶下赤白。崩漏不止。驚怖健忘。小便頻數。或白。時見虛熱盜汗。羸瘦。此藥不問胎前產後室女並皆治之。常服安心去邪。逐敗血。養新血。令有子。

當歸

木香

琥珀

沒藥

各一兩

滴乳香

二錢

麝香

辰砂

各

天癸至正當

氣旺之年豈

川  
州  
志

以親

...

卷之四

卷之四

卷八

卷之六

卷之四

卷之五

萬壽山血

海虞虞山第

不能止父爲

魚上少不北

卷之四

昔其出

戶部以刀刀

卷之四

治下焦虛冷。臍腹疼痛。帶下五色。月水崩漏。淋瀝不止。

氣不調。華便磨下。

梅湯和童便磨下○室女月候不調溫酒磨下半丸○產後血

○產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發渴面黃煎烏

酒磨下不拘時○胎息不順腹內疼痛一切產難酒重便磨下

右各另研爲細末合一處研勻水丸如龍眼核大每用一九溫

木香

丁香

各半兩

吳茱萸

抱湯

杜仲

蛇床子

五味子

丁皮

各雨

右劉如麻豆大，每用半兩，以生絹袋盛水三大觔煎數沸，取熱

重下部通手外推晚一次薰洗

立  
明  
藥  
厚  
朴

謝

茴香

炒  
出  
鹽  
血



氣血行血所  
謂氣行血流  
自無病也

夫醫者意也  
凡風寒由外  
而襲內以至  
下焦生寒証  
者以此方重  
而散之所謂  
厚之浴之開  
之發之也

由榮更滋至  
下焦方謂外  
治法于上熱  
下寒難服溫  
補之藥者宜  
之益以人功  
挽回造化今  
罕知此亦有  
病者不能言

坐藥龍鹽膏  
治帶下

玄胡索五錢厚朴二錢當歸 茴香 炒黃鹽

酒防已 肉桂 紅豆 龍骨各二錢川烏頭炮

丁香 木香各一錢五分良薑 木通各一錢全蝎三枚枯礬五分

右為末煉蜜丸彈子大綿裹留絲在外納陰戶內

勝陰丹 為上藥力小再加三錢內加行性熱藥

羌活 柴胡各二錢大蒜一錢破故紙與蒜同焙

三奈子 川烏頭 大椒各一分甘松三分升麻

枯白礬各分全蝎三個麝香少許

有為細末同前法製用

回陽丹

治帶下諸方

三

醫者無以應  
徒自待然而  
已  
此東垣先生  
所製

至閉藏者腎  
若滑脫者腎  
氣不固也壯  
蠟蟻寒而益  
腎蛇床辛溫  
而壯氣其清  
而燥者則  
用藥地榆烏  
賊其熱而補

全蝎

升麻

甘松各三分

草烏頭

羌活各三分

大椒

三奈子

萆薢

枯礬各五分

大蒜

破故紙

各二錢

水蛭

三條炒焦二錢

川烏頭

柴胡

各七分

黃蠱

三個去足炒

黃鹽

一錢必用之藥去之則不効

右為極細末

依前製如指尖大用綿裹納陰戶中覺臍下煖為

効

如聖丹

治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬

四兩

蛇床子

二兩

右為末醋為丸如彈子大用臘脂為衣綿裹放陰戶中定坐半

日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難

効此取易痊且速効而不傷臟氣也○一方用枯礬川烏各等



氣者以...

行陽明于血

海蠟垂散結

以消痰

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

分煉蜜丸如彈子大。綿裹納陰中。治帶下絕症。

○治帶下消脫

側柏地榆湯。治赤白帶下。以致不能成孕。

黃芪 側柏葉 地榆 烏賊魚骨 白蠟

牡蠣 用溫泥固濟火煨 肉蓯蓉 白芷 蛇床子 各一錢 二分

右劉加生薑三片水煎半饑時服。

白芷散。治赤白帶下。

白芷 二 海螵蛸 二個 胎髮 一團 細末 空心溫酒調下二錢。

伏龍肝散。治赤白帶下。久患不瘥。起悸乏力。六脉微濡。

櫻櫚 不拘多少 燒熾急 伏龍肝 外炷血下取赤

屋梁上懸壁 炒令烟盡

卷之三 帶下諸方

効。此取易痊。且速効而不傷臟氣也。○一方用枯礬川白芍各等分。

於久病憔悴之人恐非補劑不可

馬蹄得乾金有下之健体

而入肝經套得燥金之剛

氣而制木餘提赤筋以固

血之脫能骨烏賊以固氣

之脫益肝主疎泄而藏血

疎泄者氣脫氣脫則血不

藏以金乎之而健其高以

血滿之而固其氣宜其為

定痛之要藥也

有各等分研勻入龍腦麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋湯

下患十年者半月可安

馬蹄丸 治白帶不絕

白馬蹄 禹餘糧各四兩 龍骨三兩 烏賊魚骨 白僵蠶

赤石脂 各二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服十丸空心酒下不止加至三

十丸

固真丸 治白帶大下不止臍腹疼痛其寒憊之如冰陰中亦然

目中溜火上壅視物眊眊無所見齒皆惡熱飲痛須得黃連末

擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故

喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目申溜火腎水

由伏火也蓋人真寒者以九九九九之故曰寒在下焦者主宜溫



之夢

去腐乾而惡濕。肝經陰火上流。走於肝。或上至面目。申留於腎水。

浸肝而上。故目申眈眈無所見。齒惡熱飲者是少陽陽明經中伏火也。當大瀉寒濕。以九藥治之。故曰寒在下焦。治主宜緩。大忌湯散。以酒製白石脂。白龍骨以和其濕。以炮乾薑大辛熱瀉寒水。以黃蘗之大寒為因用。又為鄉導。故云古者雖有重罪不絕人之後。又為之伏其所主。先其所因之意。又瀉齒中惡熱飲也。以柴胡為本經之使。以芍藥半錢導之。恐辛熱之藥太甚損其肝經。故微瀉之。以當歸身之辛溫大和其血脈。用藥之法備矣。

白石脂

燒赤水飛研細焙乾

柴胡

各一錢酒煮日乾水飛為末

當歸

酒洗三錢乾薑四錢

黃蘗

酒洗各五分

右為細末

水煮稀糊為丸如鷄頭大每服三十丸空心宿食消

服藥石法亦有期讀此又

醫心方

卷三 瘧下諸方

二二二

得一種經緯

卷三

三

三

薑煎白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒溫麵

大溫下元之

一左治赤白帶下不問遠年近日並皆治之

寒濕惟久痛

龍骨半兩

舶上硫黃三錢

虛寒者宜之

右為細末每服半錢空心無灰酒下

若為丸服更

茅花散治婦人血崩不止赤白帶下

此方自是血

茅花二握

櫻櫚皮三寸嫩荷葉三張甘草節二

崩證

右為細末空心酒調半匙服

雙白丸治白帶如神

燥濕痿濕

石灰兩

白茯苓二兩

右為末水丸桐子大每服三十丸空心白水下

散服



右為水先桐子大每服三十丸空心白水下

白附丸 有婦經年崩 不止諸藥不效脉濡微此與前伏龍肝

散兼服愈

妙在狗骨頭

灰益有溫濕

之能耳

此方治四氣

七情故以為

名然以牛夏

為君則內外

二因皆能合

氣而能生濕

生痰也香附

治內此藥治

外其除又兼

內外以佐其

成功然不有

瘧而為之通

竅燥濕則亦

不能為効也

白附子 附子 兩

附子 兩

黃狗骨頭 四兩

鹿灰

右為細末 粥丸桐子大 每服三十丸

地榆膏

治赤白帶下骨立者

此濕血涼劑濕熱勝而滑勝者宜之

地榆一觔 用水三升煎至一半 去渣再煎如稠餲 絞淨空心

服三合 日二服

○治白淫白濁

加味四七湯 治婦女小便不順 甚者陰戶疼痛

半夏

湯洗七兩

厚朴 薑汁

製

赤茯苓

香附子

炒各五錢

紫蘇

甘草

各二錢

夫坎者水也  
腎主之而坎  
中之一陽乃

腎中之真氣

氣同則水旺

水旺則氣溫

氣溫則下元

煖而先天氣

虛者白濁久

而如滑如脂

或小便無度

皆氣脫也氣

脫則下焦無

火而水不溫

矣安得水升

而火降此方

能同脫溫氣

能同真火誠

治下元虛寒

右以咀分四貼每服水二鍾生薑三片煎八分去滓加琥珀末一錢調服

鎖精丸 治小便白濁或白帶淋瀝

破故紙炒 青鹽 白茯苓 五味子

為末酒糊丸桐子大空心鹽湯或酒下三十丸

固精力 治下虛胞寒小便白濁或如滑或如凝脂或小便無度

腰重等證

牡蠣煨粉 桑螵蛸酒炙 龍骨 白石脂 白茯苓

五味子 兎絲子酒蒸 韭子炒各等分

右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度



內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脉胞絡受寒小便白濁日夜不止

用按鹿茸丸

裝黃芪附子

有益精益氣

湯之攻肉

經內金壯蠟

蟬蛻龍骨有

同溫禁便之

用五味遠志

生津散而入

腎以補下無

其為補下無

好男女俱可

服

內莖蓉男得

之而助陽女

得之而孕育

已戟補髓療

精胡蘆巴治

虛令補脂

臍腹疼痛腰膝無力

鹿茸

黃耆

雞肉金

肉莖蓉

五味子

遠志肉

牡蠣

桑螵蛸

龍骨

附子各等分

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或米飲

任下

金鎖正元丹

治真氣不足吸吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟口暗

耳鳴遺精盜汗及婦人白濁白淫等證

肉莖蓉

洗

紫巴戟

去心

胡蘆巴

炒各

一斤

補骨脂

酒浸炒

五倍子

八兩

茯苓

去皮

六兩

硃砂

二兩

另研

龍骨

二兩

右為末入藥研令勻酒和丸如桐子大每服二十丸空心溫酒

鹽湯任下

起陽養五倍  
子燥陽中之陰  
珠包鎮心之  
上萬降火升  
水之妙龍骨  
固脫散為下  
元真氣不足  
者所服也  
味之淡者莫  
過於蠟而淡  
之滲者莫過  
於茯苓蓋淡  
者天之陰天  
氣降則水生  
水生則火有  
制而又以猪  
苓者茯苓者  
欲其滲之速  
以蜡為托者

威高九

治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頭

泄及婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常濕小便如米泔或

無子息

黃蠟四

白茯苓

去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於磁器

右以茯苓為末熔黃蠟杵為丸如彈子大空心細嚼滿口生津

徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只契糠醋尤忌使性氣

烏金散

治身熱口燥氣塊築痛下黃水如葵汁

百草霜

紫金皮米泔浸粉草炙各等分

右為末每服二錢艾湯或醋湯空心調下○心嘈猪血入鹽酒

下○白帶用鯉魚一尾去腸不去鱗將油髮一團入魚肚內黃

泥同燒灰火內煨存性去泥研魚為末每用一錢以陳酒調同



欲其降之選  
以蜡為托者

欲其降之選  
也亦忌使性

之句飛動肝

氣也

紫金皮通血

中之氣而散

血百草霜止

葵汁之水而

除黃氣通血

行塊痛自止

妙在甘草等

分不然何以

能治身熱口

燥也

此方簡切久

服彌佳

前藥服

一方。治婦人久積虛寒。小便白濁。滑數不禁。

鹿茸屑炒黃為細末。每服二錢。空心溫酒調服。

泥固濟。灰火內煨存性。去泥。研魚為末。每用一錢。以陳酒調同。











